
Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2018



Innehåll

3 Fågelåret 2018
Niklas Andersson

4 Fågelrapport för landskapet Västerbotten år 2018
Niklas Andersson, Andreas Garpebring, Birger Risberg, Jacob Rudhe, Ulf Skyllberg, Mikael Wikström och Niklas Lindberg Alseryd



Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF)

Västerbottens ornitologia förening är en fristående länsförening under BirdLife Sverige. En lokal fågelföreningar finns för närvarande i Umeå. VOF arbetar för att främja fågelskydd och fågelstudier i Västerbottens län samt att öka kontakten mellan fågelintresserade i länet. Alla, oavsett kunskapsnivå är hjärtligt välkomna i föreningen.

Medlemskap löses genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro PG 12911-4. Årsavgiften för medlemskap är 200:-. Ungdomar under 18 år betalar 100:-. Ytterligare familjemedlemmar boende på samma adress kostar 50:-/pp och då får hushållet en tidning.

Fåglar i Västerbotten (FIV)

Fåglar i Västerbotten (FIV) är VOF:s medlemstidning och som medlem får man 2 nummer per år samt den årliga fågelrapporten för landskapet Västerbotten.

Tidningen är beroende av att medlemmarna själva är med och bidrar med artiklar, då allt arbete med tidnignen görs på ideell basis. Tidningen har högt i tak så både artiklar med vetenskaplig och populärjournalistisk prägel är välkomna, likaså dikter, egna betraktelser, referat med mera. Har du en fågelrelaterad artikel på lager? Kontakta någon i redaktionen!

VOF:s styrelse 2020

Bertil Strömberg (ordförande)
Lövöudden 150 913 33 Umeå,
tel: 070-656 09 82
bertil.stromberg@eidola.se

Christina Adolfsson, (kassör)
Stöcksjö Åsarvägen 37
905 80 Umeå
tel: 070-591 51 78
christinaadolfsson.stocksjo@gmail.com

Dag Österlund (webbansvarig)
dag.osterlund@gmail.com

Per-Olof Nilsson (ledamot)
Agnes Eriksson (ledamot)
Hanna Eriksson (ledamot)
Jan Eriksson (ledamot)
Jan-Erik Wallin (suppleant)
Christer Olsson (suppleant)
Vill du nå samtliga i styrelsen gör du det enklast via mail: vofstyrelsen@gmail.com

FiV redaktionen:

Christer Olsson (ansvarig utgivare och redaktör)
Sofiehemsvägen 76A, 90738 UMEÅ
olssoncito@hotmail.com
070-3727935

Ritu Andersson (redaktör)
ritu.andersson@gmail.com
073-0644936

Petra Sjödin (redigerare)

Omslag: Framsidan: Sibirisk Knölsvärta. Foto: Niklas Andersson
Baksidan: Blåkråka. Foto: Niklas Andersson

Fågelrapport för Västerbotten år 2018

Niklas Andersson, Andreas Garpebring, Niklas Lindberg Alseryd, Birger Risberg, Jacob Rudhe, Ulf Skyllberg och Mikael Wikström

Denna rapport omfattar fågelobservationer gjorda i landskapet Västerbotten 2018 och är den 43:e i sitt slag.

Arter där observationerna granskats och godkänts av Sveriges ornitologiska förenings raritetskommitté (Rk) har markerats med två ** efter det vetenskapliga namnet. Arter där observationerna granskats och godkänts av Västerbottens regionala rapportkommitté (Rrk) har markerats med en * efter det vetenskapliga namnet eller efter datumet i texten.

För sällsyntare arter och raser (sedda färre än 100 ggr (d.v.s.< 100 fynd) redovisas både antalet fynd respektive antalet exemplar påträffade i landskapet i anslutning till artnamnet. Presentation av fyndstatistik kan se ut enligt följande:

Tachybaptus ruficollis (35/39 – 2/3)
De två första siffrorna anger först antalet fynd (35) och sedan antalet exemplar (39) av arten fram t.o.m. föregående års fynd. De två sista siffrorna anger först antalet fynd (2) och sedan antalet exemplar (3) gjorda under året. Det totala antalet godkända fynd och exemplar hittills i landskapet blir således summan av de första och sista siffrorna. En återvändande individ från tidigare år utgör inte ett nytt fynd/exemplar. I ett försök att begränsa textmängden förkortas superlokalerna 'Umeälvens delta och slätter' och 'Holmsunds skärgård' till 'Uds' respektive 'Hsk'. Dessutom utesluts superlokalen för välkända lokaler.

Under året påträffades tre nya arter för landskapet: sibirisk knölsvärta, stäppörn samt kaspisk trut. Detta innebär nu att 360 arter är påträffade i Västerbotten. Dessutom gjordes två fynd av en ras av blåhake (s.k. vitstjärnig blåhake) som inte har påträffats tidigare i landskapet.

På grund av resurs- och tidsbrist har vi på samma sätt som för 2017 års fågelrapport varit tvungna att banta ner denna fågelrapport till en mer slimmad version. Vissa arter som tidigare funnits med saknas kanske nu helt, eller finns nu att läsa om i en mer koncentrerad form. Urvalet av arter har skett genom följande:

- Nationella rapportkommitén (Nrk) direktiv till Regionala rapportkommitéerna (Rrk) för arter att publiceras på nationell nivå.

- Arter och raser som bedömts och behandlats av Rrk.

- Arter och raser som Rrk funnit intressanta på en regional nivå, t.ex. intressanta fenologiska fynd, höga antal, höga sträckssiffror eller arter och raser med minskande eller ökande populationer.

Under året har arbetet inom kommittén fördelats enligt följande:
Niklas Andersson: sammankallande, inledning, arttexter samt blankettgranskning
Andreas Garpebring: arttexter
Niklas Lindberg Alseryd: arttexter
Birger Risberg: arttexter & blankettgranskning
Jacob Rudhe: blankettgranskning
Ulf Skyllberg: arttexter
Mikael Wikström: korrekturläsning och blankettgranskning

Till sist vill vi tacka alla rapportörer som bidragit med observationer till årets fågelrapport!

Ännu söker vi medhjälpare i arbetet – känner du dig intresserad, tveka inte att höra av dig till idunarama@gmail.com och berätta vad du skulle kunna vara intresserad av att hjälpa till med. Hjälp behövs framförallt med att skriva arttexter, granska blanketter, men även också lokal- och artadministration i Artportalen.

Artgenomgång

Kanadagås Branta canadensis
Vinterfynd (jan): 1 ex Lövöudden 26.1 (RolfSandberg). Vinterfynd (dec): 1 ex Gamla träbron, Umeå 2-4.12 (*Bertil Brånin, Ralf Norberg), 2 ex Stöcksjön, Umeå 2.12 (Bertil Brånin), 1 ex Gimonäs, Umeå 4.12 (Christer Olsson), 1 ex Umeälven, Öbacka, Umeå 13-30.12 (*Christer Olsson, Pontus Wennesjö, Andreas Garpebring m.fl.). Fynden vid Gimonäs och Gamla träbron gäller eventuellt samma vingskadade individ som sedan höll till vid en kommunal fågelmatning vid Öbacka fram till årsskiftet. Många (vår): 1 600 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 21.4 (Roland Jansson). Många (höst): Flera noteringar med ansamlingar om över 500 ex gjordes på spridda ställen i Umeälvens delta och slätter, vid Grubbänget samt i Umeälven vid Gran. Som mest noterades 1 200 ex Vadarön, Gran, Umeå 3.9 (Roland Jansson), 1 200 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 31.10 (Ralf Norberg). Så sent som 22.11 noterades 500 ex vid Granudden, Uds (Ralf Norberg). Utanför Umeås slättlandskap noterades 500 ex Kroksjön, Kroksjö 12.10 (Ralf Norberg).

Vitkindad gås Branta leucopsis
Häckningar: Cirka 32 par fördelat på 6 lokaler fick fram ca 70 ungar. Alla häcklokaler utom en är belägna längs kusten söder om Umeå. Nordlig häckning: 4 par + 6 pulli/nyligen flygga ungar Skatudden, Boviken, Skellefteå 3.7 (Ulf-Boström). Många: max 280 ex Gran, Umeå 16.8-4.9 (Roland Jansson, Christer Olsson, Harry Pettersson), max 325 ex Röbäcksdalen, Uds 16.8-27.9 (Christer Olsson, Matthis Kaby, Birger Risberg m.fl.), 200 ex Kyrkholmen, Skellefteälven C 1.9 (Joakim Wallström), 200 ex förbifl Degernäs, SV slätten, Uds13.9 (Mats Strandberg), 217 ex Stenpiren, Skellefteälven C 17-20.9 (Anders Lindberg). Sträck: Höststräcket av arktiska brantagäss verkar helt och hållet ha gått Västerbotten förbi. Totalt noterades 38

nordsträckande respektive 100 sydsträckande individer under vår respektive höst. Samtliga fynd härrör av allt att döma från lokala populationer.

Grågås Anser anser
Vår: Den kraftiga ökningen av antalet grågäss i Umedeltat som noterades 2016-2017 fortsatte även under 2018, trots att antalet grågåsdagar minskade en hel del pga den korta rastperioden. Dagsmaxnoteringen om 2 042 ex är lägre än under 2016 (2 603 ex) och 2017 (2 459 ex), men betydligt högre än under 2015 (610 ex) och åren dessförinnan. Troligen är det den nordnorska populationen som de senaste tre åren rastat i större antal än tidigare i Umedeltat. Detta styrks bl.a. av att rastkulminationen infallit betydligt senare än tidigare.

Det skall bli mycket intressant att följa upp denna utveckling framöver. Även här är en jämförelse med Bråsjön intressant, inte minst för att utröna var häckningsområdena för grågässen är belägna. Traditionellt häckar grågåsen i skärgården i Västerbotten. Utanför Umedeltat sågs som mest 510 ex Gärde, Lövånger, 21.4 (Mattias Laisfeldt), 408 ex Kåge 25.4 (Mattias Laisfeldt), 150 ex Vebomark 1.5 (Jörgen Andersson), 160 ex Bråsjön 28.4 (Jonas Grahn) samt 180 ex 4.5 (Christer Laggar).

Höst (maxnoteringar på de större rastplatserna): Umedeltat 2 310 ex på Stöcke strandängar 5.10 (Emmanuel Naudot), Bråsjön 150 ex 18.10 (Jonas Grahn), Gärdefjärden 800 ex 14.10 (Mattias Laisfeldt), Frostkåge strandängar 500 ex 30.9 (Joakim Wallström, Patrick Degerman). Sträck: Under våren bokfördes 407 nordsträckare medan slutsumman för hösten blev 1 047 sydsträckande individer (sträckdatabasen Picea och Artportalen).

Sädgås Anser fabalis
Häckningar: En konstaterad häckning där ett par fick ut minst tre ungar finns noterad från Jörnssocken. Vår: En extremt sen vår med 50 cm snö i Umedeltat så sent som 8.4 i kombination med fortsatt djupt liggande snö både väster och norr om Umedeltat borgade för den bästa sädgåsvåren sedan 2012. Toppnoteringen om 3 360 ex den 26.4 (Per Bernhardtson, Stefan Delin, UDF) är den nästa högsta genom alla år, endast toppad av 4 200 ex 2012. Den stora majoriteten sädgäss (2 480 ex) höll till inom T-vägsområdet, som trots sin numera effektiva dränering upplevde något av en renässans under perioden 21-26.4.

Under några få dagar fullkomligen exploderade fågellivet i detta område där gäss, svanar, änder, tofsvipor, starar, skrattmåsar och diverse rovfåglar koncentrerades till en mängd mindre vattensamlingar på stubbåkrar och plöjen. Snösmältningen och avrinningen var dock snabb när den väl tog fart och redan den 28.4, två dagar efter toppnoteringen, hade 2 400 sädgäss sträckt vidare norrut. Av den anledningen hamnade antalet sädgåsdagar (23 960) i nivå med de för 2016 och 2017. Som en konsekvens av den stora koncentrationen av sädgäss i Umedeltat så notaredes som mest endast 817 ex i Bråsjön den 30.4 (Ulf Skyllberg).

I södra Vb rastade samtidigt 4 200 sädgäss den 26.4. 85% av dessa (3 600) utgjordes av tajgarasen (fabalis) och 15% (600) av tundrarasen (rossicus). Andelen tundrasädgäss var högre än normalt

vilket är ett tydligt mönster riktigt sena vårar då tundrasädgässen "tvingas" rasta i högre utsträckning än normalt i Umeåområdet.

I norra delen av landskapet rastade färre gäss än normalt, men även här med en högre andel tundrasädgås. Vid Gärde sågs 359 sädgäss 27-28.4 (Niklas Lindberg Alseryd), varav 180 tundrasädgäss. Den 4.5 var 290 kvar i Gärde och ytterligare 282 ex (222 rossicus) sågs vid Vebomarksträsket (Mattias Laisfeldt). Slutligen sågs som mest 322 sädgäss vid Tällåsen, 9.5 (Mattias Laisfeldt), varav 195 tillhörde tundrarasen. Höst: I Umedeltat byggdes antalet rastande sädgäss upp successivt, främst noterade från Bergön i Västerfjärden och på Rengrundets strandängar: 9 ex 22.8 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot), 14 ex T-vägen 31.8 (Johan Forssell), 18 ex 6.9 (Ralf Norberg), 170 ex 16.9 (Emmanuel Naudot), 320 ex 21.9 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot), 243 ex 23.9 (Thomas Sundström).

Noteringen om 320 ex är en ovanlig hög siffra för att vara på hösten. Årets sista observation i Umedeltat blev 1 ex rastande vid Storavan, 14.10 (Ralf Norberg, Gunnar Ekenberg m.fl.). Utanför Umedeltat sågs 14 ex Brånsjön 30.8 (Jonas F Grahn) samt 9 ex 18.9 (Christer Laggar), 29 ex Åviken, Gärdefjärden, 15.9 samt 1 ex 5.10 (Niklas Lindberg Alseryd), 8 ex rast Frostkåge strandnära ängar 23.9 (Joakim Wallström, Patrick Degerman).
Sträck: Under våren noterades 321 nordsträckande individer. Under hösten noterades 376 sädgäss och 502 obestämda Ansergäss på sydsträck.

Sädgås, underarten rossicus (tundrasädgås)
Anser fabalis rossicus
Vår: Stickprov under rastkulminationen i Umedeltat indikerade att 15% utgjordes av underarten tundrasägås, vilket betyder att ca 600 tundrasädgäss rastade den 26.4 (UDF). Större noteringar utanför Umedeltat utgjordes av max 21 ex Yttertavle, Umeå 20-22.4 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, Niklas Andersson m.fl.), 180 ex Gärdefjärden 27-28.4 (Niklas Lindberg Alseryd) samt 240 ex 4.5 (Mattias Laisfeldt), 22 ex Brånsjön 3.5 (Jonas F Grahn), 222 ex Vebomarksträsket 4.5 (Mattias Laisfeldt), 195 ex Tällåsen, Ostträsket 7.5 (Mattias Laisfeldt). Höst: Den stora mängden rastande sädgäss i Umedeltat under hösten resulterade i 8 rossicus den 10.9 som ökade till maximalt 45 ex den 14.9 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell). Två individer fanns kvar till 5.10 vid Storavan (Emmanuel Naudot), 1 ex Åviken, Gärdefjärden 5.10 (Niklas Lindberg Alseryd).

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus
Vår: I Umedeltat sågs 1 ex Bergön,14.4 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 4 ex Obsladan, 19.4 (Emmanuel Naudot). Därefter ökade antalet till 13-15 ex Obsladan, 20-23.4 (Emmanuel Naudot). Under perioden 24-28.4 delade dessa gäss antingen upp sig eller så sträckte de vidare och nya grupper ankom, eftersom 4-7 ex sågs vid Storavan och 6 ex på övriga Degernäs-Röbäcksslätten (Anders Hällström m.fl.). Den 28.4 uppehöll sig 14 ex samlat i Dammen N Jvg (Johan Forssell, Mikael Wikström). Dagen efter sågs 28 ex i samma damm (Andreas Garpebring) och 17 ex den 30.4 (Micael Jonsson). Den 3.5 rastade 10 ex i Västerfjärden 3.5 (Jan Melander). Vårens sista rapport blev 1 ex vid Storavan, 4.5 (Ralf

Norberg, Tommy Magnusson).
Vi bedömer att totalt 43 (15+28) individer uppehöll sig i Umedeltat. Utanför Umedeltat sågs max 5 ex Yttertavle, Umeå 21.4 (Ulf Skyllberg), 4 ex Bränsjön 28.4 (Jonas Grahn), 6 ex Gärdefjärden 27.4-4.5 (Mattias Laisfeldt, Anders Lindström, Lena Andersson, m.fl.), 20 ex Åheden, Sörmjöle 27.4 (Micael Jonsson), 6 ex Spisen, Kåge 28.4-1.5 (Mats Holmkvist, Stig Holmqvist), 10 ex Hössjö 3.5 (Peter Sunesson), 1 ex Ånäset, 4.5 (Leif Bildström), 1 ex Ersmarksängena, Kåge 7.5 (Erik Normark), 2 ex Kågemarken 7.5 (Örjan Tjernström), 1 ex Rönnholmen, Hörnefors 11.5 (Håkan Persson, Anders Carlberg), 2-3 ex Lillskärsudden 23-26.5 (Micael Jonsson, Håkan Rune).

Om vi summerar Umedeltats 43 individer med maxantalet på övriga lokaler så når vi en vårsumma om 43+59 = 102 ex. Om i stället dagsmax för samtliga lokaler summeras erhålls totalsumman 87 ex. Den senare summan är den största sedan 2014 då en rak summering av maxantal gav 122 individer i Vb.
Sommar: En udda observation av 1 ex gjordes vid T-vägen 21.6 (Viggo Norrby, Magnus Bladh).
Höst: 2 ex resp. 1 ex rast Bergön, Uds, 24.9 och 25.9 (Ralf Norberg).

Bläsgås Anser albifrons
Vår: Två ad individer sågs i Umedeltat, främst vid Obsladan 18-21.4 (Micael Jonsson, Robert Åkerlund, Christer Olsson, Emmanuel Naudot). Den 22.4 tillkom en 2K-fågel (Emmanuel Naudot). Därefter sågs 1-2 ad och 1 2K fram till 3.5 (Jan Melander). Utanför Umedeltat noterades 1 ex vid Yttertavle, Umeå 19-23.4 (Billy Lindblom, Kerstin Årdahl, Oskar Lövbom m.fl.), 2 ex Åheden, Sörmjöle 20.4 (Jon Andersson, Joakim Linder), 1 ex Spisen, Kåge 28-30.4 (Mats Holmkvist, Lars Lindmark), 1 ex Gärde, Lövånger 4.5 (Mattias Laisfeldt). En summering ger åtta bläsgäss denna vår, vilket är det lägsta antalet sedan 2009 då sju individer noterades.
Höst: 2 ex fälten vid E4, Gärdefjärden 14.10 (Mattias Laisfeldt).

Fjällgås Anser erythropus
1 2K rast Själahällan, Sörmjöle 18.5 (Karl-Gunnar Rehn, Tommy Magnusson, Christer Olsson m.fl.), 1 1K rast Stöcke strandängar, Uds 30.9 (Emmanuel Naudot). Något enstaka fynd per år är rätt ordinärt. Fågeln som sågs på Själahällan vid Sörmjöle bar färgringar och kommer från fjällgåsprojektet.

Knölsvan Cygnus olor
Häckningar: Minst sju konstaterade häckningar samt ytterligare åtta par i lämplig häckbiotop konstaterades, samtliga från kustbandet i Umeå kommun.
Inlandsfynd eller fynd utanför Umeå kommun: 1 ex Vadarön, Gran, Umeå 6.4 (Ralf Norberg), 2 ex Strömpilen, Umeå 3.10 (Joakim Linder), 2 ex Hällögern, Ratu 23.7 (Alan Dalton). Fynd från norra halvan av landskapet saknades helt detta år.

Mindre sångsvan Cygnus columbianus* (77/109 - 1/1)
1 ad rast Yttertavle, Umeå 15-22.4 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson m.fl.).



Mindre sångsvan *Foto Niklas Andersson*

Sångsvan Cygnus cygnus
Vår: Den kalla inledningen på april och den djupa snön (50 cm den 8.4) försköt rastperioden för sångsvan till långt in i april. Så sent som den 12.4 sågs den första större gruppen av arten (130 ex). Ett större inflöde kom igång först den 17.4 och sedan rastade fler än 1 000 sångsvanar 17-28.4. Rastperioden blev kort och antalen var lägre än under de senaste åren, med en topp på 3 130 ex den 21.4 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, UDF), vilket resulterade i det lägsta antalet sångsvansdagar sedan bottenåret 2013. Även det året var snörikt med en rekordsen vår men avsmältningsförloppet var betydligt snabbare än 2018 vilket begränsade rastperioden.

Utanför Umedeltat gjordes följande höga noteringar: 650 ex 21.4 Åheden, Sörmjöle (Roland Jansson m.fl.), 506 ex 21.4 Yttertavle, Umeå (Ulf Skyllberg m.fl.). På dessa lokaler sågs fler än 300 individer 18-22.4 respektive 14-21.4. Vid Yttertavle övernattar/dricker svanarna i Tavlefjärden och vid Åheden i Mjölefjärden.

Höst: En flock om 320-550 ex rastade i Österfjärden, Uds, söder om Holmen mellan 29.10-14.11 (Christer Olsson, Ralf Norberg).
Sträck: Vårens sträcksumma landade på 645 ex medan det under hösten noterades 1 176 ex, sammanräknat från Artportalen och sträckdatabasen Picea.

Grågås x kanadagås Anser anser x Branta canadensis
Sammantaget ett 20 tal observationer om 1 till 10 individer under året av denna allt vanligare hybrid. Fynden är väl spridda från Skellefteå i norr till Hörnefors i söder och de flesta är gjorda på klassiska gåsrastlokaler.
Många: 10 1K rast Vadarön, Gran, Umeå 5.9 (Roland Jansson).

Gravand Tadorna tadorna
Vår: 1 ex str NO Vitskärsudden 7.4 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 3 ex str NO Sönnerstgrundet 5.5 (Micael Jonsson), 1 ad hane rast Storviksanden, Sörmjöle 6.5 (Roland Jansson), 4 ex str Skallerhamnsskatan, Hörnefors 6.5 (Antoine Bos, Peter Nordin), 4 i par rast Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 7.5 (Christer Olsson, Anders Lindström), 1

hane rast Lövselefjärden, inre delen, Lövånger 10-12.5 (Mats Axbrink, Olle Thyrestam, Lena Andersson m.fl.), 1 hona rast Själahällan, Sörmjöle 18.5 (Sören Wulff, Ralf Norberg, Tommy Magnsson).

Höst: 1 ex förbifl Bergön, Uds 23.9 (Thomas Sundström).
Totalt sågs 17 individer fördelat på åtta fynd vilket sammantaget är ett ganska gott uppträdande av arten. Som vanligt gjordes majoriteten av fynden kustnära. Kanske kan man misstänka att de fyra fåglarna som sågs sträckande vid Hörnefors den 6.5 kan vara samma fåglar som dagen efter hittades i Lövselefjärden, Lövånger.

[**Mandarinand** Aix galericulata]*
26/30 – 2/2) 1 hane Ön, Umeå 3.5 (Ann-Katrin AX Sjögren), 1 hane rast Ersmarksängena, Kåge 7.5 (Erik Normark), 1 hane stationär Nordanå, Skellefteå 9.6-6.9 (Ulf Wiklund, Erik Normark, Pontus Wennesjö m.fl.). Fågeln vid Nordanå bedöms som en återvändare från tidigare år och utgör alltså inget nytt fynd.

Årta Anas querquedula
Möjliga häckningar: Under försommaren sågs arten med starka indicium för häckning på tre lämpliga häckningslokaler, men någon säkerställd häckning kunde tyvärr inte konstateras: 3 ex Storavan, Stöcke 1.5-28.6 (Lars Bruks, Johan Forssell, Emmanuel Naudot m.fl.), 4 ex Bråsjön 10.5-4.6 (Birger Risberg, Christer Laggar, Dag Österlund m.fl.), 2 i par Dammen N Jvg, Uds 28.5 (Christer Olsson).
Sent höstfynd: 1 ex str SV Sönnerstgrundet 3.9 (Sören Wulff, Lars Edenius).

Skedand Anas clypeata
Möjliga häckningar: Minst 32 par observerades under häckningstid i lämplig biotop, relativt väl spridda över landskapet även om majoriteten av paren observerades inom Umeälvens delta och slätter.

Snatterand Anas strepera
Under året observerades cirka 53 individer fördelade på 25 fynd, varav majoriteten var under våren. Två inlandsfynd gjordes vid Bråsjön och Vajsjön, Norsjö.

Fynd under häckningstid: 2 i par misslyckad häckning Bråsjön 6-31.5 (Dag Österlund, Thomas Ågren, Christina Adolfsson m.fl.), 2 i par rast Öster-Sandskär, Täftelandet 19-27.5 (Emmanuel Naudot), 2 hanar Dammen N Jvg, Uds 26.5-29.6 (Christer Olsson, Emmanuel Naudot, Göran Moheim), 2 honf Karl-Fredriksholmen, Skellefteälven C 19.6 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson).
Höstfynd: 1 ex Vajsjön, Norsjö 6.8 (Anders Sundkvist, Christina Lindquist), 4 ex rast Dammen N Jvg, S Degernässlätten 10.8 (Andreas Garpebring), 3 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 3.9 (Birger Risberg), 2 i par rast Lillskärsudden 11-12.9 (Ralf Norberg, Rolf Sandberg, Emmanuel Naudot), 1 hane rast Lillskärsudden 30.9 (Micael Jonsson, Pontus Wennesjö, Frida Johnsson).

Bläsand Anas penelope
Vinterfynd (dec): 1 honf rast Umeå uthamn, Holmsund 10-12.12 (*Ralf Norberg, Torbjörn Yttergren, Gunnar Ekenberg m.fl.).
Många: 1 000 ex rast Dammen N Jvg, S Degernässlätten, Uds 29.4 (Andreas Garpebring).

Höststräck: Sammanlagt noterades 2 178 sydsträckande individer i Artportalen plus sträckdatabasen Picea (korrigerat för dubbelräkningar). Bästa dag blev den 11.9 då 843 sydsträckande ex noterades vid Ostögrundet (Andreas Garpebring, Mikael Wikström, Ulf Skyllberg). Jämfört med det exceptionella simandssträcket hösten 2017, då över 15 000 sydsträckande bläsänder noterades under en knapp vecka i september, så blev det alltså en återgång till betydligt blygsammare siffror.

Stjärtand Anas acuta
Möjliga häckningar: 5-6 par har rapporterats i lämpliga miljöer under häckningstid, vilket får anses som ett blygsamt resultat.
Många rastare vår: 60 ex Vebomark, Lövånger 1.5 (Jörgen Andersson), 60 ex Gärdefjärdens naturreservat 6.5 (Niklas Lindberg Alseryd).
Höststräck: Totalt har 705 individer rapporterats sydsträckande från augusti till oktober. Som mest sågs 282 ex vid Ostögrundet 30.8 (Emmanuel Naudot).

Kricka Anas crecca
Vinterfynd (jan): 1 2K hane Mariehemsdammen, Umeå 1-9.1 (Kjell Grankvist, Dag Österlund, Jörgen Kragh m.fl.).
Många: Ett flertal noteringar om summor på mellan 400 till 3 000 rast krickor finns från olika lokaler inom Umeälvens delta och slätter 24.4-6.5. Som mest noterades ca 3 000 ex SÖ Degernässlätten, Uds 29.4 (Andreas Garpebring).
Maxsiffror från övriga lokaler: 750 ex Brånsjön 30.4-4.5 (Dag Österlund m.fl.), ca 1 000 ex kring Vebomark, Lövånger 4.5 (Mattias Laisfeldt), 1 100 ex Gärdefjärdens naturreservat 5-6.5 (Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 580 ex Lövselefjärden, Lövånger 6-7.5 (Niklas Lindberg Alseryd, Christer Olsson), 400 ex Ersmarksängena, Kåge 7-10.5 (Erik Normark, Joakim Wallström), 1 000 ex Tällåsen, Ostträsket 7.5 (Mattias Laisfeldt).
Sträck: Under våren noterades sammanlagt 63 nordsträckande krickor och under hösten 222 sydsträckare. Högsta dagssummorna blev 54 ex Lillklyvan, Hsk 21.4 (Thomas Sundström) och 109 ex Ostögrundet 30.8 (Emmanuel Naudot). Vinterfynd (dec): 1 hona Fodercentralen, Holmsund 10-11.12 (*Karl-Gunnar Rehn, Ralf Norberg, Gunnar Ekenberg m.fl.).

Brunand Aythya ferina
2 i par rast Dammen N Jvg, Uds 27.4-31.5 (Anders Hällström, Emmanuel Naudot, Mikael Wikström m.fl.), 1 hane rast Tavastenstigen (Bådelögern-Tavastudden), Täftelandet 29.4 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 2 hanar Megrundet, Hörnefors 3.5 (Eskil Nygren), 1 hane rast Kattögeltjärn, Bussjön 4.5 (Dag Österlund, Mats Strandberg, Henrik Blommé), 2 i par rast Västerlångslädan, Holmsund 18.5 (Lennart Karlsson).
Samtliga av årets sju individer fördelade på fem fynd sågs i landskapets södra delar under vårsträcket. Det är nu mer än 17 år sedan något häckningsfynd gjordes i landskapet. Lämpliga biotoper tycks helt saknas för arten som numera endast ses på genomsträck.

Vigg Aythya fuligula
Vinterfynd (jan-feb): 1 ad hane Lasarettsdammen-Mariehemsdammen, Umeå 3.1-11.2 (Thomas Sundström, Rolf Segerstedt, Tommy Magnusson m.fl.), 1 hona Vitskärsudden 21.1 (Sören Wulff, Gunnar Odell), 1 hona Fodercentralen, Holmsund 26.1 (Rolf Sandberg), 1 hona Lövöudden 27.1 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Jörgen Andersson).

Den hane som övervintrat med gräsänder inne i centrala Umeå sedan 2015 och glatt många fågelintresserade Umebor föll denna vinter förmodligen offer för någon predator.

Den 11.2 påträffades resterna av fågeln intill Lasarettsdammen. Möjligen blev den ett skrovmål för någon av de duvhökar som brukar ses stryka omkring i området under vintern.
Många: 860 ex Grossgrunden, Holmöarna 6.10 (Per Bernhardsson).
Sträck: Under våren noterades sammanlagt 214 nordsträckande viggar medan det under hösten blott bokfördes 33 sydsträckare. Enda dagen med högre siffror blev 21.4 med 95 ex Lillklyvan, Hsk (Thomas Sundström).
Vinterfynd (dec): 4 ex Buten, Hsk 5.12 (Ralf Norberg), 1 ex Karlsborg, Holmsund 16-17.12 (Emmanuel Naudot, Dag Österlund), 1 honf. Lövöudden 27-30.12 (Ralf Norberg, Thomas Sundström, Joakim Linder).

Bergand Aythya marila
Häckningar: 2-3 par + 9 pulli Lövselefjärden, Lövånger 11.5-17.8 (Joakim Wallström, Håkan Olsson, Anna Sundelin m.fl.), 1 ad hona + 7 pulli Sandviken, Rickleå, Bygdeå 26.7 (Per Wedholm). Utöver detta sågs cirka 15-17 par i lämpliga häckningsbiotoper utmed kusten.

Alförrädare Polysticta stelleri*
(94/214 - 1/1) 1 hona str SV Tavastudden 19.5 (Emmanuel Naudot). Tredje fyndet i landskapet sedan år 2010.

Ejder Somateria mollissima
Säkra häckningar: Minst 15 ådor sedda med pull har rapporterats. En klar majoritet av häckningarna gjordes i Sörmjöle skärgård och vid Bjuröklubb.
Vinterfynd: 4 honf Vitskärsudden 7.1 (Emmanuel Naudot), 1 honf Lövöudden 3.2 (Thomas Sundström), 1 honf Gråbolandsviken, Hörnefors 12.12 (Ralf Norberg).

Sträck: Under våren inräknades 152 nordsträckande individer, på olika lokaler vid kusten. En låg siffra, men mycket beror på hur sträckbevakningen är längs kusten.

Vitnackad svärta Melanitta perspicillata* (5/5 - 1/1) 1 ad hane rast Grundskatan, Bjuröklubb 19.5 (*Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Staffan Andersson, Mattias Laisfeldt). Västerbottens sjätte vitnackade svärta. Första fyndet sedan 2012, som också det var ett majfynd som gällde en individ som sågs på sträck norrut utmed kusten.

Årets individ sågs först rasta med svärtor en bit ut i havet för att sedan lyfta och sträcka mot NO en stund senare. Arten är årlig i Sverige och oftast görs några enstaka fynd, främst i södra delen av landet. Knappt tre veckor efter fyndet vid Grundskatan sågs en gammal hane rasta i en mindre sjö ovanför Pajala, kanske var det samma individ?

Svärta Melanitta fusca
Vinterfynd (jan): 2 ex Holmsund 2.1 (Antoine Bos), max 11 ex Lövöudden 2-14.1 (Thomas Sundström, Christer Olsson, Sören Wulff m.fl.), 3 ex Kont, Yttre Västerfjärden 4.1 (Thomas Sundström), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 25.1 (Lars Edenius).

Sträck: Under våren bokfördes 959 nordsträckande svärtor (Artportalen plus sträckdatabasen Picea). Bästa



Sibirisk Knölsvärta *Foto: Niklas Andersson*

dagssumman blev 286 ex Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Håkan Olsson). Under hösten bokfördes blygsamma 174 sydsträckare.

Vinterfynd (dec): 1 ex yttre Byviken, Holmön 1.12 (Per Hansson), 1 ex Patholmsviken, Holmsund 11.12 (Ralf Norberg), 3 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 13.12 (Nils Karlsson), 5 ex Lövöuddeen 15-30.12 (Thomas Sundström, Ralf Norberg, Gunnar Ekenberg m.fl.), 2 ex Karlsborg, Holmsund 16.12 (Emmanuel Naudot, Joakim Linder), 2 ad S Sköthällan, Holmöarna 23.12 (Per Hansson), 2 honf Näsuddens lotsplats, Skelleftehamn 26-28.12 (Mattias Laisfeldt, Fredrik Grahn), 1 ex Buten, Hsk 26.12 (Thomas Sundström), 2 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 28.12 (Mattias Laisfeldt).

Sibirisk knölsvärta Melanitta stejnegeri**
(0/0 - 1/1) 1 3K+ hane rast Skallerhamnsskatan, Hörnefors 4-14.5 (*Tommy Magnusson, Ralf Norberg m.fl.).

Norrlands första fynd av knölsvärta. Under tio dagar fanns förmånen att beskåda denna oerhört karismatiska fågel som tillsammans med svärtor höll till mellan Blågrundsudden och Megrundet (en sträcka på knappt 3 km fågelvägen) och stundtals kunde ses på mycket nära håll. Knölsvärtan rasbestämdes till underarten stejnegeri, som häckar i östra Sibirien. Sveriges första fynd av knölsvärta gjordes så sent som 2012.

Sjöorre Melanitta nigra
Häckningar: 3 ex pulli/nyligen flygga ungar Lill-Grönnan, Vajsjön, Norsjö 9.8 (Anders Sundkvist, Christina Lindquist). Dessutom noterade samma observatörer 4 ad + 10 1K i Vajsjön 6.8. vilket innebär minst en, möjligen flera häckningar i Vajsjön. Häckningar av sjöorre är mycket sällsynta i Västerbottens landskap och under 2000-talet finns inga tidigare publicerade häckningsfynd. Det kan dock misstänkas att enstaka par genomför häckningar så gott som årligen i den skådarfattiga NV delen av

landskapet.

Vinterfynd (jan): 2 honf Lövöudden 2-8.1 (Thomas Sundström, Christer Olsson, Sören Wulff m.fl.), 3 ex Vitskärsudden 7.1 (Emmanuel Naudot), 1 honf Blågrundsudden, Sörmjöle 9.1 (Ralf Norberg), 2 ex Norrmjöle fiskehamn 10.1 (Christer Olsson), 1 honf Vånören, Burvik 10.1 (Erik Normark).

Vinterfynd (dec): 1 honf Lövöudden 5-21.12 (Christer Olsson, Ralf Norberg, Gunnar Ekenberg), 3 honf Karlsborg, Holmsund 5-15.12 (Ralf Norberg, Thomas Sundström), 2 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 28.12 (Mattias Laisfeldt), 1 honf yttre Byviken, Holmön 31.12 (Per Hansson). Ett normalt uppträdande av arten under vintermånaderna sett till de senaste åren.

Vårsträck: Sammanlagt bokfördes 2 409 ex under vårsträcket. Bästa dagssumman blev 571 ex Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Håkan Olsson).
Höststräck: Bara blygsamma 389 sydsträckande sjöorrar noterades. Sträcksummorna är korrigerade för dubbelräkningar och är en sammanslagning av rapporter till Artportalen och sträckdatabasen Picea.

Alfågel Clangula hyemalis
Vinterfynd (jan): 1 hane Sönnerstgrundet 2.1 (Mikael Wikström), 1 honf Flakaskär, Yttre Västerfjärden 4.1 (Thomas Sundström).
Vårsträck: Sammanlagt bokfördes 318 ex. Höga dagssummor var 80 ex Ostögrundet 12.5 (Mikael Wikström), 60 ex Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Håkan Olsson).

Höststräck: Bara blygsamma 80 sydsträckande ex har rapporterats. Sträcksummorna är korrigerade för dubbelräkningar och är en sammanslagning av rapporter till Artportalen och sträckdatabasen Picea.

Vinterfynd (dec): 3 ex str SV Lövöudden 2.12 (Emmanuel Naudot), 3 ex Lövöudden 5.12 (Christer Olsson), 1 ex str SV Lövöudden 25.12 (Thomas Sundström).

Knipa Bucephala clangula
Många: 545 ex Ostögrundet 9.9 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström, Ralf Norberg m.fl.).

Salskrake Mergellus albellus
Möjliga häckningar: Någon häckning har inte konstaterats, men två observationer gjordes under häckningstid i lämpliga biotoper: 1 hona Stavträsket, Villvattnet, Burträsk 2.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Patrick Degerman), 1 hona Vajsjön, Norsjö 8.6 (Per Hansson).
Vinterfynd: 1 honf str SV Lövöudden 30.12 (Thomas Sundström).

Småskrake Mergus serrator
Vinterfynd: 3 ex Lövöudden 28.12 (Joakim Linder), 3 honf sträckande SV Lövöudden 30.12 (Thomas Sundström).
Sträck: 883 nordsträckare respektive 325 sydsträckare har rapporterats för vår respektive höst. Bägge summorna är jämförelsevis låga och speglar säkerligen att sträckbevakningen har legat på en relativt låg nivå.

Tjäder Tetrao urogallus
Spelande tjädrar finns noterade från sammanlagt 10 spelplatser under året. Endast två av dessa avser spel där det

noterats fler än fem tuppar. Båda ligger i större naturreservat med gammelskog. I övrigt finns 10 konstaterade föryngringar. En stor majoritet av dem återfinns i landskapets SÖ del. Den fyndbilden torde snarare spegla skådaraktiviteten än tjäderpopulationens utbredning.

Orre Lyrurus tetrix
Minst fem fynd med flockar om fler än 50 exemplar har rapporterats. Fynden är från spridda lokaler i landskapets södra halva. Både 2017 och 2018 var goda skogsfågelår och de stora flockarna speglar säkerligen de goda häckningsresultaten under dessa år.

Dalripa Lagopus lagopus
Totalt har arten observerats på 20 lokaler under året. Fynd med högre häckningsindicier har dock inte rapporterats.

Samtliga: 4 ex Åsmyran, I20-skogen, Umeå 2.1-3.10 (Lars Edenius, Andreas Bernhold, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 4 ex Klappmark, Gravmark 2.1-6.3 (Henry Lingesten), 1 ex död Dalfors, Bullmark 11.1 (Karl-Gunnar Rehn), 2 ex Nyland, Nicknoret, Norsjö k:n 15.1 (Lars Eliasson), 1 ex Hundsjön, Rödåsel 16.3 (Per-Olof Nilsson), 4 ex Åtmyrberget, Granö 27.3 (Isak Vahlström), 3 ex Stormyran, I20-skogen, Umeå 1.4-17.5 (Per Wedholm, Kerstin Årdahl, Tommy Magnusson m.fl.), 1 ex Norr-Korbeberget, Granö 8.4 (Henrik Sporrong), 1 ex Bergamyran, Gravmark 17.4 (Henry Lingesten), 3 ex Rödstensbackens NR, Gravmark 22-29.4 (Andreas Garpebring), 1 ad Långmyran, Gravmark 7.5 (Henry Lingesten), 2 ex Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 9.5 (Erik Normark), 1 ex Petträsket, Nicknoret, Norsjö k:n 13.5 (Lennart Wigenstam), 1 ex Isklinten NR, Botsmark 25.5 (Mattias Oskarsson), 1 ex Stor-Ekträsket, Ekträsk 6.6 (Albin Enetjärn), 8 ex Krokån, Botsmark 7.10 (Lars Edenius), 4 ex Brännträsket, Villvattnet, Burträsk 27.11 (Lars Edenius), 1 ex Svansele dammängar, Norsjö 13.12 (Erik Normark), 1 ex Rengårdsberget, Botsmark 29.12 (Joakim Öhman), 1 hane Långträsket, Gravmark 30.12 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson).
Precis som för de senaste åren saknas fynd av dalripa helt i norra delen av landskapets kustregion medan fynden i övrigt är tämligen väl spridda över rapportområdet. Frågan är om denna bild speglar ett verkligt utbredningsmönster hos dalripan eller om den bara visar på rörelsemönstret hos landskapet fågelskådare?

Vaktel Coturnix coturnix
Samtliga: 1 sp Degernäs, NV slätten, Uds 27.5-29.6 (Mats Strandberg, Karl-Gunnar Rehn, Christer Olsson m.fl.), 1 sp T-vägen, Uds 1-22.6 (Johan Forssell, Tommy Andersson, Christina Adolfsson m.fl.), 1 sp Tavelsjö skola 22-23.6 (Andreas Garpebring, Torgny Nilsson, Tommy Magnusson), 1 sp Östra Stärkesmark, Tväråbäck 22.6 (Henrik Sporrong). Endast fyra spelande individer är ett magert resultat för denna jordbruksknutna art.

[**Fasan** Phasianus colchicus]
Samtliga: 2 ex Tomterna 24.2 (Gunnar Odell), 1 ex Tomterna, Nedre Sävarån 18.4 (Mats Boström), 1 hane Avanvaken, Tavelsjö 26.10 (Bertil Brånin). Samtliga fynd bedöms härröra från utplanteringar för jaktändamål.
Smålom Gavia stellata
Häckningar: Totalt 10 konstaterade



häckningar och därtill ytterligare 14 möjliga häckningar. Observationerna fördelar sig sockenvis enligt följande: Umeå 2 konstaterade och 3 möjliga häckningar, Holmön 3 konstaterade och 3 möjliga häckningar, Sävar 2 konstaterade och 1 möjlig häckning, Nysätra 1 möjlig häckning, Lövånger 1 konstaterad och 4 möjliga häckningar, Skellefteå 1 konstaterad och 2 möjliga häckningar, Byske 1 konstaterad häckning.

Enda fyndlokalen som befinner sig mer än 2 mil från kusten är vid Tavelsjön i Umeå där det sedan tidigare finns en känd inlandshäckande population. Antalet rapporterade fynd är i linje med dem för de senaste åren, men torde bara utgöra en liten andel av den faktiska populationen som är väl spridd längs hela landskapets kust.
Vinterfynd: 1 ex Norrmjöle fiskehamn, Hörnefors, Vb 10.1 (Christer Olsson).

Storlom Gavia arctica
Häckningar: åtta konstaterade häckningar i landskapet. Att sex av dessa återfinns i Umeås närhet säger mer om var det bor många fågelskådare än om var storlommen har sina häcksjöar.
Vinterfynd: 1 ex Näsuddens lotsplats, Skelleftehamn 27-28.1 (Joakim Wallström, Patrick Degerman, Mattias Laisfeldt), 1 ex Lövöudden-Karlsborg 15-25.12 (*Thomas Sundström, Emmanuel Naudot, Kerstin Årdahl m.fl.). Fågeln vid Lövöudden var oljeskadad och hade eventuellt även en skadad vinge.

Vitnäbbad islom Gavia adamsii
1 ad rast Holmögadd 13.5 (Johan Forssell). Endast ett fynd av arten under året är anmärkningsvärt. Medelvärdet för den senaste tio-årsperioden har legat på närmare sex individer per år. Arten ses framförallt under vårflyttningen i slutet av april och under större delen av maj och vanligtvis görs ofta något enstaka höstfynd. Arten har sitt utbredningsområde på tundran i Ryssland, Alaska och Kanada.

Ob. islom Gavia immer/adamsii
1 2K islom sågs sträcka norrut under tidig morgon på St Fjäderägg 20.5 (Andreas Garpebring). Enligt rapportören rör sig fyndet om en trolig svartnäbbad islom. Fyndet utgör det enda av en sträckande islom 2018.

Ob. små-/storlom Gavia stellata/arctica
Vår: totalt räknades 1 793 nordsträckande lommar mellan 14.4-2.6 (varav 1 063 bestämda storlommar och 105 bestämda smålommar). Endast två dagar med fler än 100 sträckande lommar noterades under perioden: 158 ex str NO, Ostögrundet 12.5 (Mikael Wikström m.fl.) från sträckdatabasen Picea), 146 ex str NO Lillhällan, Holmön 13.5 (Andreas Garperbing).

Höst: 178 sydsträckande lommar inräknades under hösten (varav 87 bestämda storlommar och 60 bestämda smålommar). Det är nu många år sedan Västerbottensskådarna fick uppleva ett bra lomsträck. Det har nu gått så långt att siffran om drygt 6 000 vårsträckande lommar 2014, som då ansågs vara medioker, idag ter sig som en bra siffra. För att få hitta riktiga toppår med fler än 25 000 sträckare får man gå tillbaka till 2010.

Smådopping Tachybaptus ruficollis
Samtliga: 1 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 9.12 (*Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn). Endast ett fynd gör 2018 till det sämsta året för smådopping i

Västerbotten sedan 2012.

Gråhakedopping Podiceps grisegena
Cirka 21 par noterades under häckningstid på 14 lokaler med lämplig häckningsbiotop. Under 1996 års stora inventering uppskattades stammen till ca 200 häckande par i landskapet. Många av lokalerna där arten har häckat eller potentiellt skulle kunna häcka besöks sällan av ornitologer. Stammen verkar de senaste åren hålla sig på en relativt stabil nivå baserat på inrapporteringen till Artportalen.

Skäggdopping Podiceps cristatus
I en inventeringsrapport över häckande fåglar i Umeälvens delta 2018 (Christer Olsson) görs bedömningen att det förelåg 23 skäggdoppingsrevir i området vilket är en klar minskning jämfört med 1997 då 36 revir noterades vid en liknade inventering. Inom samma område noterades fyra ungkullar 2018 jämfört med nio 1997.
Dessutom föreligger observationer av par i lämpliga biotoper på ytterligare två lokaler: 2 par sp Gumbodahamn, byn, Ånäset 7.5 (Christer Olsson), 1 par Brånsjön 12.5 (Micael Jonsson).

Svarthakedopping Podiceps auritus
Cirka 38 par under häckningstid fördelat på 21 lokaler med lämpliga häckningsmiljöer har rapporterats. Majoriteten av observationerna är gjorda i landskapets östra delar där också majoriteten av rapportörerna håller till. Arten trivs gärna vid mindre sötvatten, såsom mindre sjöar, tjärnar, golfbanedammar och slättsjöar etc.
Vinterfynd: 1 ex rast Sönnerstgrundet 2.1 (Mikael Wikström).
Rördrom Botaurus stellaris*
(8/8 - 0/0) 1 sp Gästerviken, Brattåsfjärden 12.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 sp Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger 29.5 (Allan Larsson). Arten är mycket sällsynt i Västerbotten och är långt ifrån årlig, så två observationer fördelat på två olika lokaler under ett och samma år hör verkligen inte till vanligheterna. Rrk gör dock bedömningen att observationerna skulle kunna gälla samma individ och att det dessutom förmodligen är samma individ som under 2017 höll revir i Gärdefjärden.

Gråhäger Ardea cinerea
Möjliga häckningar: 2 ex lämplig häckbiotop Oxviken, Bureå 2.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Patrick Degerman). I övrigt noterades spridda fynd av enstaka individer under perioden 2.4-23.10. Inga större grupper eller ansamlingar finns noterade under året.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Inga fynd som tyder på häckning föreligger från året, och förutom några fynd av fiskande fåglar upp till ett par mil uppefter Umeälven så föreligger inte heller några renodlade inlandsfynd.
Vinterfynd: 1 ex Djupsundsudden 37, Holmsund 2-17.12 (Ulf Viklund, Marcus Östman, Jan Roslin), max 5 ex Umeå uthamn, Holmsund 14-30.12 (Gunnar Ekenberg, Niklas Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex Ljumviken, Holmsund 23-27.12 (Ralf Norberg, Thomas Sundström), 3 ex Lövöudden 23-30.12 (Ralf Norberg, Thomas Sundström), 1 ex Tavastudden 26.12 (Gunnar Odell), 1 ex Kont, Yttre Västerfjärden 30.12 (Ralf Norberg).

Många: Max 774 ex Kälsgrundet, Sönnerstgrundet 15-30.5 (Per Johan Ulfendahl, Ulf Sperens, Rolf Sandberg),

400 ex Ostnäsfjärden 17.5 (Bertil Brånin, Hans Bång).

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Sex säkra häckningar och ytterligare fyra möjliga häckningar noterades från lokaler spridda över större delen av landskapet, men med en klar tyngdpunkt till kustområdet.

Bivråk Pernis apivorus
En säker häckning i Vännäs kommun, utöver detta inga fynd med högre häckningsindicier är noterade, men under häckningstid sågs ensamma fåglar eller par på ett 40-tal lämpliga lokaler spridda över stora delar av landskapet. På en handfull av lokalerna gjordes upprepade fynd under häckningssäsongen vilket borde stärka indicierna på häckning.

Höst: 80 sträckande bivråkar är en god höstsumma. Nästan alla individer som åldersbestämdes var ungfåglar. Den extremt torra sommaren i stora delar av landet var uppenbart gynnsam för åtminstone nordligt häckande bivråkar. Fina dagar inföll den 16.9 då 34 ex passerade Sönnerstgrundet (Emmanuel Naudot, Johan Forssell m.fl.), samt den 23.9 då 26 ex sågs vid Harrevelsudden,

Täftelandet (Ulf Skyllberg). Båda noteringarna hamnar på topp 5 genom åren och noterbart är den sena sträcktoppen för en art som vanligtvis har avslutat sitt sträck i mitten av september. Milt väder och längre perioder med SV-V vindar under september borgade för en mycket god rovfågelshöst.

Större skrikörn Clanga clanga*
(16/16 - 1/1) 1 2K+ förbifl Bergön, Uds 18-23.9 (Emmanuel Naudot, Anders Hällström). Första obsen på fem år i landskapet. Tidsmässigt stämmer fyndet väl in på tidigare års fynd som också gjorts under andra halvan av september och ofta i närheten av större fält med närliggande vattendrag. Tack vare bra bilddokumentation kunde det bekräftas att det var samma individ som sågs sträcka ut vid Falsterbonäset i Skåne den 18.10.

Stäppörn Aquila nipalensis**
(0/0 - 1/1) Efter en lång väntan dök så äntligen landskapets första stäppörn upp. Fågeln sågs mitt på ljusa dagen sträcka mot SO, på låg höjd över observatörens hus: 1 2K str SO Holmö kyrkväg 55, Holmöarna 20.6 (Per Hansson). Detta var Norrlands sjätte fynd av arten.

Kungsörn Aquila chrysaetos
Häckningar: sex par lyckades få ut sju flygga ungar.
Höst: nio sydsträckande individer, vilket är ett tämligen normalt antal.

Sparvhök Accipiter nisus
Höst: 192 sträckande sparvhökar har rapporterats in. Bästa dagsnoteringarna blev 43 ex Sönnerstgrundet 16.9 (Johan Forssell, Ralf Norberg m.fl.), 31 ex Klubben, Sörmjöle 6.10 (Ulf Skyllberg).

Duvhök Accipiter gentilis
Höst: 20 sydsträckande duvhökar noterades denna goda rovfågelshöst.

Brun kärrhök Circus aeruginosus
Häckning: 1 konstaterad häckning där ett par fick fram minst två flygga ungar vid Gärdefjärden 28.4-11.8 (Mats Axbrink, Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt m.fl.).
Möjlig häckning: 1 hona som höll till vid

Brånsjön 20.5-30.6 varnade efter uppflog 30.6 (Christer Laggar), dock saknas det rapporterade fynd av hanar från Brånsjön under häckningstid. Därutöver föreligger det observationer av enstaka fåglar eller par på ett tiotal lämpliga häckningslokaler i landskapet. Särskilt många rapporter av både hanar och honor föreligger från Storavan, Stöcke (Rolf Sandberg m.fl.) och Dammen N Jvg, Uds (Emmanuel Naudot m.fl.) samt kring Innerviksfjärdarnas naturreservat, Skellefteå (Stig Holmqvist m.fl.). Det förefaller sannolikt att det förekommit åtminstone häckningsförsök vid någon av dessa lokaler. Fåglarna vid Storavan och på Degernässlätten kan mycket väl vara samma individer då avståndet mellan lokalerna är litet.

Övriga fynd vid lämpliga häckningslokaler: 1 hane Burefjärden, Bureå 19.5 (Urban Grenmyr, Linus Andersson), 1 hane Bodtjärn, Bodbysund, Burträsk 31.5-1.6 (Albin Enetjärn, Mattias Laisfeldt), 1 ex Vajsjön, Norsjö 8.6 (Per Hansson), 1 hona. Skråmträsk, Skellefteå 26.6-10.8 (Stig Holmqvist, Mattias Laisfeldt), 1 hane Inre-Ljusvattnet, Burträsk 30.6 (Joakim Linder), 1 hona Hemsjön, Sibirien 2.7 (Andreas Garpebring), 1 ad hane Älgnäs, Lövånger 6.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 hona Tavlefjärden, 9.7 (Per Hedström).

Sent höstfynd: 1 2K+ hona Storavan, Stöcke 14.10 (Ralf Norberg, Gunnar Ekenberg m.fl.), 1 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 14.10 (Jan Eriksson). Rapporterna avser sannolikt samma individ.

Blå kärrhök Circus cyaneus
Fynd under häckningstid: 1 hona Degernäsbäcken, S väg, Uds 27.5-2.6 (Kerstin Årdahl, Thomas Ågren, Christina Adolfsson).
Många: 15 hanar Djäkneböleslätten 25.4 (Ralf Norberg, Eskil Nygren, Julia Pettersson).
Höststräck: 14 sydsträckande individer har noterats.
Sent fynd: 1 honf förbifl Långviksskatan, Täftelandet 7.11 (gnm Gunnar Odell).

Stäpphök Circus macrourus
Att bedöma hur många stäpphökar som setts under våren i landskapet får nog anses vara en omöjlig uppgift. En klar majoritet av fynden under våren var av utfärgade hanar. I bara Umeå kommun sågs förmodligen minst åtta hanar under april månad och därtill finns ytterligare fynd från Ånäset, Myckle och Kåge under samma tidsperiod, även om dessa fynd förmodligen kan gälla samma individer som tidigare setts i Umeå.

Vår: 1 3K+ hane förbifl Obsladan, Uds 16.4 (Anders Hällström, Sören Wulff, Lars Edenius m.fl.), 1 3K+ hane Djäkneböleslätten 19-26.4 (Henrik Blommé, Rolf Segerstedt, Andreas Garpebring m.fl.), 1 3K+ hane förbifl Södra Bösta, Sörmjöle 22.4 (Dag Österlund, Karl-Gunnar Rehn), 1 3K+ hane förbifl Granvägen 5, Nedre Sävarån 22-23.4 (Mikael Wikström), 2 3K+ hane Umeälvens delta och slätter 22-30.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Christer Olsson, Ralf Norberg m.fl.), 1 3K+ hane rast Byviken, Obbola 22.4 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 1 hane förbifl fälten V om Klintsjöberget, Ånäset 23.4 (Jimmy Nyman), 1 2K+ hona Obsladan, Uds 24-26.4 (Johan Forssell, Thomas Sundström, Jan Melander m.fl.), 1 hane Lillskärsudden 25.4 (Christer Olsson), 1 hane Myckle 25.4 (Stig Holmqvist), 1 3K+ hona rast Storbäcken vid E4, Bäck, Bygdeå 27.4 (Niklas Andersson, Jörgen

Andersson, Agnes Eriksson), 1 ad hane Kälen, Kåge 28-29.4 (Mats Holmkvist, Lars Lindmark), 1 hona Hökmark, Lövånger 4-11.5 (Mattias Laisfeldt, Lena Andersson, Anders Lindström m.fl.), 1 hona str N Gästerviken, Brattåsfjärden 18.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).

Sommar: 1 2K hane rast Dammen N Jvg, Uds 6-9.6 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot, Christer Olsson m.fl.), 1 2K hona rast Dammen S Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 6-9.6 (Emmanuel Naudot), 1 3K hane Estersmark, Ånäset 9.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 1 3K+ hane Båtvik, Byske 11.6 (gnm Urban Lundström), 1 3K+ hane förbifl Gamla Bryggeriet, Teg - T-vägen, Uds 20.6 (Birger Risberg, Niklas Andersson, Agnes Eriksson).

Höst: 1 ad hane Rickleå, Bygdeå 4.8 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 1 ex Gärde, Lövånger 9.8 (Joakim Wallström, Patrick Degerman), 1 1K hona Dammen N Jvg, Uds 20-29.8 (Gunnar Ekenberg, Emmanuel Naudot, Johan Forssell m.fl.), 1 1K Gärde, Gärdefjärden 25.8 (Lennart Öhmark, Allan Larsson), 1 ex förbifl Gravkapellet, Landskyrkan, Skellefteå 26.8 (Joakim Wallström), 1 1K hane rast Dammen N Jvg, Uds 2-5.9 (Emmanuel Naudot, Birger Risberg, Lars Edenius m.fl.), 1 1K str SV Klubben, Sörmjöle 25.9 (Ulf Skyllberg).

Ängshök Circus pygargus* (13/13 - 2/2)
1 hona fd Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 14.5 (Gunnar Ekenberg), 1 2K hona T-vägen, Uds 18-19.6 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Rolf Segerstedt). Landskapets fynd nummer 14 och 15.

Brun glada Milvus migrans
Totalt sågs fyra individer under året. Bruna gladans populationsstorlek i Sverige är mycket liten och det görs få säkra häckningsfynd varje år. Antalet häckande par uppskattas till 15, varav de flesta finns i Norrbotten och de övriga är spridda över Götaland. I Norrbotten räknar man numera med omkring fem par årligen.

I Västerbotten har ännu ingen häckning konstaterats. Arten är sällsynt, men regelbunden, på sträck igenom landskapet främst under slutet av april och under maj månad samt månadsskiftet augusti/september. I Sverige kategoriseras arten som starkt hotad (EN).
Samtliga: 2 ex stationär Dåvamyrans soptipp, Umeå 6.5-26.6 (Niklas Lindberg Alseryd, Mikael Wikström, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 2K förbifl Lilltuvan, Uds 13.5 (Christer Olsson, Tommy Magnusson, Anders Enetjärn m.fl.), 1 2K+ förbifl Dammen S Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 1.9 (Björn Gustafsson).

Havsörn Haliaeetus albicilla
Häckningar: I landskapet finns i nuläget 32 kända revir, vilket är en ökning med drygt 10 revir på bara 7-8 år. Häckningsutfallet blev 23 par som påbörjade häckning, av dessa lyckades 12 par med sin häckning och fick totalt ut 15 flygga ungar.

Fjällvråk Buteo lagopus
Häckningar: 2 konstaterade i Skellefteå kommun.

Vår: Ynkliga 87 sträckare finns noterade i sträckdatabasen Picea.
Höst: Totalt 218 fjällvråkar noterades i sträckdatabasen. Bästa dag blev 6.10 då 56 ex räknades vid Klubben, Sörmjöle

(Ulf Skyllberg). Trots hyfsat fina sträckantal för rovfåglar häckande i inland och längs kusten, som bivråk, ormvråk, tornfalk och stenfalk så blev summan för fjällvråken mer modest.

Vinterfynd: 1 ex Plattan, E4 kontrollplats, Uds 3-26.12 (Elias Forsberg, Nils Karlsson, Dag Österlund m.fl.), 1 adult hane Obbola industritipp, Uds 15.12 (Niklas Andersson, Pontus Wennesjö, Agnes Eriksson m.fl.), 1 ex Valsfäboda, Bygdeå 21.12 (Patrik Wikström). En försiktig bedömning är att observationerna vid Röbäcksslätten, Obbolatippen och Grubbänget gäller samma fågel då inga rapporter har kommit från olika lokaler under samma dygn.

Ormvråk Buteo buteo
Höst: Totalt 143 sydsträckande ormvråkar har rapporterats in till sträckdatabasen Picea. Bästa dagen inföll 25.9 med 42 sträckare vid Klubben, Sörmjöle (Ulf Skyllberg).
Sent fynd: 1 ex Fällbäcken, Boviken 11.11 (Mats Holmkvist).

Vattenrall Rallus aquaticus
(92/95 - 9/9) Samtliga: 1 sp Storavan, Stöcke 12.5-28.6 (*Christer Olsson, Tommy Andersson, Andreas Garpebring m.fl.), 1 sp Långsjön, Överklinten 18.5-13.6 (*Mats Walheim, Sören Wulff, Niklas Andersson m.fl.), 1 sp Brånsjön 21.5-12.6 (*Christer Laggar, Rolf Sandberg, Lars Edenius m.fl.), 1 hona sp Nolbyn, Lövånger 21.5-2.6 (*Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Patrick Degerman), 1 sp Jämtebölesjön, Tväråbäck 3-10.6 (*Henrik Blommé, Mikael Wikström, Johan Forssell), 1 sp Prästsjön, Strömbäck 7.6 (Osborne Lindberg), 1 ex rast Stora Tuvan, Uds 2.7 (Christer Olsson), 1 ex död Båtvik 31.7 (Carolina Åman), 1 ex död Sillviken, Täftefjärden 16.10 (gnm Ralf Norberg). Sex spelande individer på lika många lokaler samt ytterligare tre fynd, där två avser döda fåglar, utgör den hittills högsta årsnoteringen för arten i landskapet.

Som för många andra kortflyttande arter torde även vattenrallen gynnas av de allt mildare vintrar som följer i klimatförändringens spår. Trenden i Västerbotten verkar även den vara ökande även om antalet fynd än så länge är så få att slumpen säkert kan spela in.

Kornknarr Crex crex
Samtliga: 1 sp Ängsbacka naturreservat, Uds 17-18.5 (*Christer Olsson, Lars Edenius m.fl.), 1 sp Gammelbyn, Lövånger 6.6-6.7 (*Anders Lindström, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 1 sp Fjälbyn, Lövånger 9-30.6 (*Staffan Andersson, Niklas Lindberg Alseryd), 2 sp T-vägen, Uds 16.6-13.7 (*Johan Forssell, *Mikael Wikström, Rolf Segerstedt m.fl.), 1 sp Västanträsk, byn, Bygdsiljum 18.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 sp Uttersjön, Lövånger 22-23.6 (Staffan Andersson, Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt).

Sju spelande kornknarrar på totalt sex olika lokaler är en normal årssumma för Vb sett i ett längre tidsperspektiv. Den uppgång i antal fynd som noterades under perioden 2002-2013, då oftast 10-20 kornknarrar noterades, tycks således vara bruten. Årets första fynd, det vid Ängsbacka naturreservat, är värt ett extra omnämnande eftersom det gjordes på en för kornknarr mycket märklig lokal, ett lövslybevuxet och vattenfyllt dike i kanten mellan lövskogen vid

Ängsbacka naturreservat och Alviks golfcartbana. Långt från närmaste åkermark!

Småfläckig sumphöna Porzana porzana
Samtliga: 1 sp Långsjön, Överklinten 16-26.5 (Mats Walheim), 1 sp Bråsjön 20.5-7.6 (*Ralf Norberg, Ragnar Lagerkvist m.fl.), 1 sp Nolbyn, Lövånger 3.6-6.7 (Niklas Lindberg Alseryd, *Staffan Andersson m.fl.), 2 sp Prästsjön, Strömbäck 6-9.6 (*Andreas Garpebring, Osborne Lindberg), 2 sp Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger 2-3.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 2 sp Ursviksfjärden, Skellefteå 9-20.7 (*Patrick Degerman, Fredrik Grahn, Fredrik Asplund), 1 sp Rönnskär, Skelleftehamn 13.7 (Karin Lindström), 1 sp Innerträsket, Älgträsket, Lövånger 17.7 (Niklas Lindberg Alseryd).
Åtta fynd av totalt 11 ex är snudd på rekorduppträdande, dock slaget av 2006 då 12 spelande individer noterades. Under ett normalår görs fyra fynd av lika många individer. Sammanlagt har det nu gjorts 148 fynd i landskapet. Notabelt för 2018 var att flertalet sumphöns hittades i den norra delen av landskapet.

Sothöna Fulica atra
Inte heller under detta år kunde några fynd med häckningsindicier konstateras. Vinterfynd: 1 ex Fodercentralen, Holmsund 27.1 (Marcus Östman, Elin Näsström, Jan Roslin m.fl.).
Vår: 2 ex Umeälven, Öbacka, Umeå 22-27.4 (*Joakim Öhman, Maud Tyboni, Emil Larsson m.fl.), 1 ex Bölesholmarna, Umeå 22-23.4 (*Albin Enetjärn, Tommy Magnusson, Christer Olsson m.fl.), 1 ex Dammen N Jvg, Uds 27-28.4 (*Anders Hällström, Ralf Norberg, Christer Olsson m.fl.), 2 ex Umeå uthamn, Holmsund 28.4 (Robert Stenmark), 1 ex Nydalasjön, Umeå 30.4-3.5 (Micael Jonsson, Abdullah Al-Hayali, Katarina Stenman m.fl.). Rapporterna från Öbacka, Bölesholmarna och Nydalasjön bedöms gälla samma individer. Sammantaget ger detta en årssumma om fem individer. Samtliga årets observationer är från landskapets södra kustområde.

Trana Grus grus
Rastande vår: I Umedeltat rastade som mest 692 tranor den 21.4 (Ulf Skyllberg, Emmanuel Naudot, UDF), vid Bråsjön övernattade 850 tranor den 28.4 (Jonas F Grahn) och vid Kågegården, Kåge, rastade som mest 1 241 tranor den 25.4 (Mattias Laisfeldt). För övrigt finns inga summor överstigande 300 rastande tranor i landskapet.
Vårsträck: 963 tranor räknades på insträck över Norra Kvarken vid Nornässkäret kl 10-15 den 18.4 (Ulf Skyllberg), vilket är den näst bästa dagssumman genom åren för vårsträcket över Kvarken.

Rastande höst: I Umedeltat uppehöll sig ca 500 tranor 1-23.9 (Ralf Norberg, Thomas Sundström).
Höststräck: Hela 2 287 sydsträckande tranor kunde inräknas vid Skellefteå värmeverk och Vitberget, Skellefteå den 5.9 kl 6-13 (Aron Andersson), vilket är tredje högsta sträcksumman genom åren i Vb under hösten. Tranor som passerar Skellefteå sträcker ut över Kvarken mot Finland i höjd med Ånäset-Bygdeå. Om detta sker i början av september, så är målet veteodlingarna vid Söderfjärden, Vasa där ca 8 000 tranor uppehåller sig samtidigt varje höst.

Strandskata Haematopus ostralegus
Häckningar i inlandet: 1 ex ruvande Tavelsjön 17.5 (Musse Björklund, Per Lif, Tommy Magnusson). Dessutom ett flertal fynd under häckningstid kring Vännäs, Bygdeträsket och Burträsket.
Många: 56 ex str NO Lillklyvan, Hsk 21.4 (Thomas Sundström).

Tofsvipa Vanellus vanellus
Sent höstfynd: 1 ex förbifl Plattan, E4 kontrollplats, Uds 3.11 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson). De flesta tofsvipor brukar lämna landskapet redan under juli-augusti men enstaka individer kan stanna betydligt längre. Fenologirekordet är den 3.12 2000.
Många: Ansamlingar om 100-200 individer finns noterade från olika lokaler i Umeälvens delta och slätter och från Brånsjön under vårmånaderna.

Ljungpipare Pluvialis apricaria
Häckning: En konstaterad häckning, 1 ad med 1 pull Butjärnmyran, Gravmark 26.6 (Henry Lingesten, Anita Lindberg). Dessutom fynd under häckningstid på ytterligare en dryg handfull lokaler. Då arten i Västerbotten främst häckar på relativt torra öppna myrar, en miljö som mycket sällan besöks av ornitologer, är mörkertalet vad avser häckningar säkerligen mycket stort.
Många: 300 ex Brännland, Umeå 6-10.5 (Bertil Brånin, Christer Olsson), 200 ex Hössjöbäcken, Hössjö 6.5 (Peter Sunesson), 200 ex Degernäs, NV slätten, Uds 6.5 (Joakim Linder, Ragnberth Helleday), 400 ex Hökmark, Lövånger 6.5 (Anders Lindström, Lena Andersson), 500 ex Storavan, Stöcke 7-10.5 (Thomas Ågren, Micael Jonsson, Andreas Drott m.fl.), 300 ex Ersmarksängena, Kåge 7.5 (Erik Normark), 730 ex fälten i SO, Hissjö 8.5 (Tommy Magnusson, Henrik Blommé).

Kustpipare Pluvialis squatarola
Inga vårfynd gjordes under 2018!
Höst: Totalt räknades 271 sydsträckare 25.7-7.10. En jämförelsevis låg summa. Bästa dag blev 11.8 då sammanlagt 114 ex (korrigerat för dubbelräkningar) inräknades vid de fyra olika lokalerna Ostögrundet, Tavastudden, Klubbsand på östra Ängesön och Bjuröklubb. Utöver sträckande fåglar noterades sammanlagt ynka 10 rastande ensamma fåglar fördelat på 5 olika lokaler.

Större strandpipare Charadrius hiaticula
Inga säkra häckningar konstaterade under året, men ca 20 par har rapporterats från sammanlagt 12 olika lokaler längs kusten. Flest vid de skådartäta södra delarna av landskapet.
Höststräck: Sammanlagt noterades 86 sydsträckande ex under perioden 18.7-29.9. En låg siffra som speglar att det var få dagar med bra väder för vadarsträck under artens huvudsakliga sträckperiod i juli-augusti.

Mindre strandpipare Charadrius dubius
Två konstaterade häckningar: 1 ad med 2 pulli Norra Grundfjärden, Burvik 30.7 (Erik Normark), 1 par med 2 pulli Långviksskatan, Täftelandet 12.8 (Emmanuel Naudot). Dessutom föreligger fynd som tyder på häckning på åtminstone ytterligare 17 platser. De flesta fynden är koncentrerade till södra kustlandet och till grustag, industrimarker och liknade biotoper i närheten av Umeå stad.
Inlandsfynd: 1 ex Brånsjön, Vännäs 8-11.5 (Tommy Magnusson m.fl.).

Fjällpipare Charadrius morinellus
Endast ett fynd gjordes under året. Ett dåligt år med andra ord, om än inte unikt. Exempelvis så gjordes också åren 2013 och 2014 bara ett fynd. Arten bedöms på riksnivå ha en stabil population så den magra förekomsten i Västerbotten 2018 får skyllas på väderomständigheterna. År med högtrycksbetonat väder under andra halvan av maj, då Västerbotten normalt sett berörs av flyttande fjällpipare, passerar de "värdshus förbi" och rastar inte i kustlandet.
1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 26.5 (Tobias Burlin).

Småspov Numenius phaeopus
Häckningar: Inga konstaterade häckningar men spelande eller varnande fåglar på sju lokaler spridda i de inre delarna av landskapet har rapporterats. Det låga antalet fynd från lämpliga häckplatser speglar troligen bara att myrmarker i landskapets inre delar är en biotop som bara mycket sällan besöks av fågelskådare.

Vårsträck: Sammanlagt räknades 190 småspovar på nordsträck 3-27.5 med högsta antalet 65 ex vid Grundskatan 8.5 (Erik Normark).
Höststräck: Under höststräcket noterades 219 sydsträckande småspovar 16.7-30.8 med högsta antalet 117 ex vid Ostögrundet 25.7 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot)

Storspov Numenius arquata
Häckningar: Precis som för flertalet andra jordbruksmarksfåglar går det dåligt för storspoven. Arten är globalt rödlistad och populationsminskningar sker i både södra och norra Sverige enligt Svensk häckfågeltaxering, även om minskningen är långsammare i norr. Då spovar är långlivade fåglar märks ofta inte en minskning som beror på dålig ungfågelproduktion förrän den har pågått en längre tid. Huvudorsaken till minskningen anses vara förändringar och rationaliseringar inom jordbruket, där allt tidigare vallskördar leder till många misslyckade häckningar.

I Västerbotten finns noteringar om lyckade storspovhäckningar på ca 20 lokaler under 2018, där alla utom en är i jordbrukslandskapet. De flesta noterade häckningarna är gjorda i de jordbruksrika delarna i landskapets SO del samt i "mellanbygden" kring Ånäset-Lövånger.
Vår (högsta antalet rapporterade rastande individer om minst 100 ex redovisas för respektive lokal): 150 ex Lillskärsudden 21-22.4 (Karl-Gunnar Rehn, Ralf Norberg), 300 ex Hörnåns utlopp, Hörnefors 21.4 (Anders Hällström), 208 ex Obbolabron, Uds 22.4 (Emmanuel Naudot), 120 ex Obbolstenarna, Yttre Västerfjärden 22.4 (Kerstin Årdahl), 550 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 23.4 (Lars Edenius, Eskil Nygren), 200 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 24.4 (Ralf Norberg), 210 ex Plattan, E4 kontrollplats, Uds 24.4 (Thomas Sundström), 160 ex Gran, Umeå 24.4 (Roland Jansson), 145 ex Vadarön, Gran, Umeå 25.4 (Roland Jansson), 326 ex Gärdefjärden 27.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 240 ex Bråsjöns naturreservat 28.4 (Jonas F Grahn), 120 ex Tjärn, Skellefteå 30.4 (Ulf Boström). Sammantaget är detta de högsta noterade summorna av rastande storspovar på många år.

Siffran ska dock inte tolkas som att det har skett någon generell ökning av antalet storspovar, utan att den snarare speglar årets snö- och väderförhållan-

den under artens flyttperiod.
Sträck: Totalt registrerades, korrigerat för dubbelräkningar, 809 nordsträckande storspovar 16.4-20.5 och 92 sydsträckare 20.6-30.8. Högsta dagssumman blev 558 ex str NO Lillklyvan, Hsk 22.4 (Thomas Sundström).

En imponerande dagssumma, inte sedan 2004 har det i landskapet noterats fler sträckande storspovar under en dag. Det är dock en bra bit kvar till dagsrekordet om 1 500 nordsträckare som noterades 24.4 1999 från Hörnefors vattentorn.

Myrspov Limosa lapponica
Vårfynd: årets första fynd blev en hane som rastade på fälten vid E4, Gärdefjärden 4-6.5 (Mattias Laisfeldt, Staffan Andersson, Anders Lindström m.fl.). I övrigt noterades rastande myrspovar på ett 10-tal lokaler, främst i landskapets södra kustområde. Enda lite större ansamlingen blev 25 ex Villanäsbankarna, Uds 10.5 (Kjell Grankvist).

Sträck: Korrigerat för dubbelräkningar och sammanslaget från Artportalen och sträckdatabasen Picea landar slutsiffrorna på 43 nordsträckare individer under våren (8.-13.5) och 83 sydsträckare under hösten (19.7-15.9). Sträcksiffrorna är de klart lägsta som noterats i landskapet sedan 1998. Kräftgången med låga totalsiffror för sträckande myrspov fortsatte alltså ännu ett år.
Sent höstfynd: 1 ex Lillskärsudden 3.10 (Jörgen Fritzson).

Rödspov Limosa limosa
Vårfynd: 1 ex rast Bråsjön 10-12.5 (Christer Laggar, Bertil Brånin m.fl.).
Höstfynd: 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 10.9 (Joakim Linder).


Två fynd är ett normalt uppträdande för arten som har setts årligen sedan 2004, med undantag för 2010.

Vårfynden gäller förmodligen den i sydligaste Sverige häckande rasen limosa, men det är också fullt möjligt att vissa av vårfynden är av den isländska rasen islandica, som närmast häckar på Island, men flyttar förbi Sverige. Samtliga höstfynd efter mitten av augusti rör förmodligen islandica eftersom limosa oftast lämnar landet i början av augusti.

Roskarl Arenaria interpres
Sex möjliga häckningar har inrapporterats, alla från den södra delen av landskapets kuststräcka: 2 i par varnande Sörbölekobbarna, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), 2 i par varnande Skolkarna, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), 2 i par varnande Käringskär, Norum 9.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 6 i par varnande Käringbådan, Norum 9.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson).
I övrigt gjordes under året inga anmärkningsvärda fynd av arten, vare sig i fråga om höga antal, sena eller tidiga fynd.

Kustsnäppa Calidris canutus
Inga vårfynd har rapporterats under 2018!

Höststräck: totalt under perioden 24.7-22.9 noterades, korrigerat för dubbelräkningar, ynka 87 sydsträckande kustsnäppor, det klart sämsta resultat som noterats i landskapet sedan Västerbottens skådare börjat bevaka fågelsträcket längs kusten någorlunda regelbundet.



Roskarl *Foto: Niklas Andersson*

Rastare under hösten: 1 1K Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 8.8 (Tommy Magnusson), 1 1K Lillskärsudden 21.8 (Rolf Segerstedt), 1 ad Lillskärsudden 26-31.8 (Micael Jonsson, Lenard Kapusta, Joakim Linder m.fl.), 3 ex Ostögrundet 29.8 (Wilhelm Dietrichson), 2 1K Långviksskatan, Täftelandet 2.9 (Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson, Michael Gruber), 1 ex Holmögadd 8.9 (Joakim Linder), 1 1K Gästerviken, Brattåsfjärden 8.9 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 22.9 (Matthis Kaby).

Brushane Calidris pugnax
Häckningar: 7 pulli/nyligen flygga ungar Dammen N Jvg, Uds 16.7 (Emmanuel Naudot, Christer Olsson). I övrigt har det observerats sammanlagt 10-talet fåglar varav minst 3 honor i Bråsjön under häckningstid (juni - början av juli) samt spridda grupper av främst hanar på sex olika platser i Umeälvens delta och slätter inklusive Storavan under samma period. I en inventeringsrapport från Christer Olsson om häckande fåglar i Umeälvens delta under 2018 görs bedömningen att det förelåg 26 revir av brushane i området. Detta är en klar ökning jämfört med 1997 då 18 revir noterades i samband med en liknade inventering.

Högsta antalet rastare om minst 300 ex per lokal under våren: 500 ex Ersmarksängarna, Kåge 10.5 (Joakim Wallström), 400 ex Storavan, Stöcke 10.5 (Hans Norelius, Eva Edmert, Pontus Wennesjö m.fl.), 1 000 ex Ersmark, Kåge 12.5 (Joakim Wallström).

Myrsnäppa Calidris falcinellus
Endast sju fynd av totalt 10 ex gör 2018 till ett av de sämre åren på länge för myrsnäppa i landskapet. Man får leta sig tillbaka till 2009-2011 och 2013 för att hitta något liknande. Vädret var högtrycksbetonat under perioden för myrsnäppans vårsträck förbi Västerbotten och bidrog inte till att vadare gick ner och rastade. Ett av fynden gjordes i norra delen av landskapet. Inga fynd gjordes under hösten.

Samtliga fynd: 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 23.5 (Tommy Magnusson, Kerstin Årdahl), 1 ex Kågeälvens delta 23.5 (Joakim Wallström), 1 ex lockläte Bråsjön 27.5 (Lars Edenius), 1 ex Storavan, Stöcke 29.5 (Christer Olsson), 3 ex Lillskärsudden 30.5 (Christer Olsson), 2 ex Dammen N Jvg, Uds 31.5-1.6 (Emmanuel Naudot, Andreas Garpebring), 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 4.6 (Emmanuel Naudot, Kerstin Årdahl m.fl.).

Spovsnäppa Calidris ferruginea
Samtliga fynd: 2 ex förbifl Dammen N Jvg, Uds 28.7 (Christer Olsson), 1 1K str SV Lövöbådan, Hsk 25.8 (Thomas Sundström), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson), 4 1K str SV Lillklyvan, Hsk 15.9 (Thomas Sundström).
Fyra observationer om totalt åtta exemplar är en mycket låg årssumma som väl speglar att 2018 var ett sällsynt uselt år för arktiska vadare i Västerbotten.

Mosnäppa Calidris temminckii
Som vanligt inga fynd som tyder på häckning. Ansamlingar om fler än 30 ex var 45 ex Storavan, Stöcke 9.5 (Ulf Boström), 74 ex Gästerviken, Brattåsfjärden 18.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 32 ex Tarvsundet, Yttre Västerfjärden 24.5 (Ralf Norberg, Tommy Andersson)

Sandlöpare Calidris alba
Samtliga fynd: 2 ex str SV Ostögrundet 25.7 (Mikael Wikström, Emmanuel Naudot), 6 ex str SV Ostögrundet 30.7 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström, Henrik Ramebäck m.fl.), 1 ad rast Östnördestgrundet, Skeppsviks skärgård 31.7 (Emmanuel Naudot), 1 ad str SV Ostögrundet 25.8 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson), 2 ex str SV Sönnerstgrundet 3.9 (Sören Wulff, Lars Edenius), 1 1K rast Gästerviken, Brattåsfjärden 8.9 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 1K rast Lillskärsudden 11.9 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Emmanuel Naudot), 1 1K rast Lillbådan, Hsk 14.9 (Joakim Lessmann), 1 1K rast Skötgrönnan, Burvik 29-30.9 (Elis Ölfvingsson, Axel Jensen, Johan Jensen). Tio fynd om totalt 18 individer är en låg årssumma, men inte förvånande då samma mönster kan urskiljas för övriga arktiska vadare under 2018.

Kärrsnäppa Calidris alpina
Höststräck: Totalt noterades 971 sydsträckare sammanräknat från Artportalen och sträckdatabasen Picea och korrigerat för dubbelräkningar. Klart bästa dagssumman blev 539 ex str SV Ostögrundet 30.8 (Emmanuel Naudot).

Skärsnäppa Calidris maritima
Samtliga fynd: 1 ex str St Fjäderägg 7.10 (Andreas Garpebring), 1 ex rast Kläppudden, Norrmjöle 7.10 (Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn, Ralf Norberg m.fl.), 2 ex och 1 ex str SV Tavastudden 13.10 resp. 14.10 (Emmanuel Naudot), 9 ex rast Holmögadd 20.10 (Johan Forssell).
Fjorton ex fördelat på fem fynd är en rätt normal årsskörd. Fyndet på Holmögadd sticker ut, där hela nio exemplar sågs rasta den 20.10, vilket för landskapet är en hög siffra, men knappast anmärkningsvärt om det hade varit i landets södra hälft.

Småsnäppa Calidris minuta
Vårfynd: 1 ex rast Lillskärsudden 13.5 (Micael Jonsson), 2 ex Gumbodahamn, gästhamnen, Ånäset 3.6 (Leif Bildström).
Höstfynd: 1 1K rast Lövöbådan, Hsk 25.8 (Thomas Sundström), 1 ex str SV Sönnerstgrundet 29.8 (Micael Jonsson), 1 ex str SV St Fjäderägg 3.9 (Christer Olsson), 1 1K rast Svart-Lass, Hsk 7.9 (Thomas Sundström), 1 1K rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 10-12.9 (Emmanuel Naudot, Rolf Segerstedt, Tommy Magnusson m.fl.), 1 1K rast Dammen N Jvg, Uds 11.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg, Alexander Gustavsson m.fl.), 2 1K str SV Svart-Lass, Hsk 14.9 (Thomas Sundström), 3 1K str SV Lillklyvan, Hsk 15.9 (Thomas Sund-

ström).

Morkulla Scolopax rusticola
Sena fynd: 1 ex rast Naturbruksgymnasiet, Umeå 4.11 (Ola Sundberg), 1 ex förbif Norra Hedensbyn, Skellefteå 5.11 (Mattias Laisfeldt), 1 ex förbifl Holmsund 25.11 (Joakim Linder), 1 ex stationär Mellan-åkern, Holmö by 25.12 (Per Hansson).
Fyndet på Holmöarna är nytt fenologirekord för landskapet, det tidigare senaste höstfyndet är från 15.12 1987.

Dvärgbeckasin Lymnocryptes minimus
Fynd under häckningstid: 1 sp Brånsjön 14.5-11.6 (Dag Österlund, Mikael Wikström, Lotta Berg m.fl.), 1 sp Prästsjön, Strömbäck 6.6 (Andreas Garpebring).
Vårfynd: 1 ex rast Gärdefjärden 7.5 (Christer Olsson), 1 ex rast Ratuträsket, Djäkneboda 9.5 (Ralf Norberg), 1 ex rast Gråbolandsviken, Hörnefors 10.5 (Christer Olsson), 1 ex rast Lillskärsudden 13.5 (Micael Jonsson).

Höstfynd: 1 ex rast St Fjäderägg 25.8 (gnm Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 29.9-4.10 (Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson, Jörgen Fritzson m.fl.), 1 ex rast Skötgrönnan, Burvik 29.9 (Elis Ölfvingsson, Axel Jensen, Johan Jensen), 1 ex rast Lillskärsudden 7.10 (Emmanuel Naudot), 3 ex rast Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 7.10 (Birger Risberg), 1 ex rast Långviksskatan, Täftelandet 13.10 (Emmanuel Naudot), 2 ex str SO Storsand, Bjuröklubb 14.10 (Joakim Wallström, Patrick Degerman, Mattias Laisfeldt).

Dubbelbeckasin Gallinago media* (84/90 - 1/1)
1 ex sp Brånsjön 22-25.5 (*Lars Edenius, Peter Sunesson m.fl.). Arten är, med knapp nöd, årlig i landskapet.

Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Sent fynd: 1 ex rast Fläsebadet, Yttre Västerfjärden 20.11 (Karl-Gunnar Rehn).

Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus
Vårfynd: 1 ex Lillskärsudden 20.5 (Christina Adolfsson, Thomas Ågren), 1 hane rast Skatudden 26.5 (Ulf Boström), 1 ex rast Gråbolandsviken, Hörnefors 27.5 (Ralf Norberg, Karl-Gunnar Rehn), 28 ex str NO Nornässkäret, Norum 27.5 (Ulf Skyllberg), 1 ex förbifl Dammen N Jvg, Uds 28.5 (Tommy Magnusson), 1 ex str N Dammen N Jvg, Uds 29.5 (Emmanuel Naudot), 2 ex str N Dammen N Jvg, Uds 1.6 (Ralf Norberg, Sören Wulff, Lars Edenius m.fl.), 2 ex rast Brånsjön 1-3.6 (Dag Österlund, Christer Laggar, Birger Risberg m.fl.).

Höstfynd: 1 ad rast Dammen N Jvg, Uds 24.7 (Emmanuel Naudot), 2 ex str O Farleden, Holmöleden 3.9 (Per Hansson). Under våren rapporterades 37 ex fördelat på åtta fynd, vilket ligger under medel, men det skiftar mycket mellan åren, det krävs oftast regn och rätt vindar för att vi ska få många fynd. Höstfynd är betydligt ovanligare så årets två är ett relativt normalt utfall.

Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicarius* (8/8 - 1/1)
1 ex Tavastudden 30.9 (Emmanuel Naudot). Nionde fyndet för landskapet och det första på tio år. Det första fyndet gjordes 1972 i Vajsjön, Norsjö där för övrigt även det tredje fyndet för Vb

gjordes 17 år senare! Alla övriga sex fynd är gjorda vid, eller i närheten av, kusten. Cirka 75% av de brednäbbade simsnäppor som rapporteras i Sverige ses under hösten under månaderna september-november då fåglarna framförallt når Västkusten i samband med hårda västvindar. I normalfallet ses 10-20 individer av arten per år i landet.

Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Många: 40 ex rast Eriksskär, Brattåsfjärden 26.7 (Lennart Öhmark).

Rödbena Tringa totanus
Många: 35 ex Lövselefjärden, Lövånger 10.5 (Anders Lindström, Lena Andersson).

Dammsnäppa Tringa stagnatilis*
(20/20 - 1/1) 1 ex rast Dammen N Jvg, Uds 17-28.5 (*Emmanuel Naudot, Christer Olsson m.fl.). Efter två år utan observationer av arten i landskapet så var det så åter dags igen. Denna gång dessutom en långstannare på en lättillgänglig lokal, vilket gladde många skådare och bidrog till att en del andra ovanligheter också upptäcktes i närheten, såsom t.ex. ängshök och rostgumpsvala. Fyndet 2018 var ett typiskt sådant för Vb, dvs. gjort i maj i södra delen av landskapet. Rrk Vb har gjort en översyn av tidigare fynd och reviderat bedömningen av vilka fynd som är nya respektive antas utgöras av återvändande fåglar. Av Västerbottens nu 21 fynd är 18 gjorda i maj och 19 i södra delen av landskapet.

Grönbena Tringa glareola
Många: max 300 ex rast Ersmark, Kåge 7-12.5 (Joakim Wallström, Erik Normark), 100 ex rast Storavan, Stöcke 10.5 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 100 ex rast Brånsjön 12.5 (Micael Jonsson), 130 ex rast Dammen N Jvg, Uds 6.7 (Emmanuel Naudot).

Svartsnäppa Tringa erythropus
Många (>30 ex): 37 ex rast F.d. Vebomarksträsket, Lövånger 6.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 35 ex Kågeälvens delta 7.5 (Mats Holmkvist), 35 ex rast Sandviken, Rickleå, Bygdeå 9.5 (Ralf Norberg), 37 ex rast Västerfjärden (Berga), Uds 10.5 (Håkan Olsson), 30 ex rast Storavan, Stöcke 12.5 (Christer Olsson).
Sent höstfynd: 1 1K rast Lillskärsudden 2.10 (Ralf Norberg, Joakim Linder).

Gluttsnäppa Tringa nebularia
Sent fynd: 1 ex rast Blågrundsudden, Sörmjöle 21.10 (Micael Jonsson).

Tretåig más Rissa tridactyla
Samtliga rapporter: 1 1K str SV Lövöudden 10.11 (Emmanuel Naudot), 1 1K str SV Lövöudden 11.11 (Christer Olsson, Joakim Linder m.fl.), 4 1K str SV Tavastudden 11.11 (Emmanuel Naudot). Med ledning av klockslag för fynden den 11.11 kan det konstateras att det var fem olika fåglar som sågs denna dag fördelat på två olika lokaler.
Återigen ett år med få fynd av tretåig más i landskapet. Inget fynd under våren och endast tre under hösten. Normalt utfall har tidigare varit två till sex fynd under våren och fyra till tio under hösten. Sedan 2015 har dock fynden i landskapet varit färre. Tillfälligheter eller en trend? Globalt sett har arten minskat kraftigt sedan 1980-talet. Det europeiska beståndet (inkl. Grönland) bedöms ha minskat med mer än 40% under denna period och internationellt klassas därför arten som hotad. Det har under lång tid konstaterats en låg produktion av ungar i kolonierna. Orsaker till detta har bedömts vara att födotillg-

ången minskat till följd av intensifierat industriellt fiske samt inverkan från global uppvärmning.

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus
Vinterfynd: 1 1K str SV Lövöudden 25.12 (Thomas Sundström).
Större kolonier: Max 510 ex Långsjön, Överklinten 6.5 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Hanna Eriksson m.fl.), 300 ex Lägdsjön, Robertsfors 9.5 (Ralf Norberg). Många: 1 000-2 000 ex på olika platser inom Umedeltats slättlandskap (Obsladan, T-vägen, S Degernäsbäcken, Storavan) 22-29.4 (Christer Olsson, Andreas Garpebring, Julia Pettersson).

Dvärgmås Hydrocoloeus minutus
Häckningar eller möjliga häckningar: 15 ex ruvande Kamviken, Burträsk 27.5 (Leif Bildström), 4 ad permanent revir Bureå 30.5 (Frank Öman), 2 ex varnande Stor-Sandskär, Uds 7.6 (Christer Olsson), 60 ex varnande 17.6 (Peter Sunesson) resp. 6 ex 26.6 Skahällan, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), 9 ex bobesök Ommensstenarna, Boviken 18.6 (Fredrik Grahn), 30 ex varnande Obbolstenarna, Yttre Västerfjärden 21.6 (Mats Axbrink), 12 i par ruvande Lillklyvan, Hsk 23.6 (Christer Olsson, Thomas Sundström), 18 ex varnande Lunnagrundet, Uds 25.6 (Christer Olsson), 2 i par varnande Sörbölekobbarna, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), 4 ex varnande Lill-Sandskär, Uds 3.7 (Christer Olsson), 6 i par besöker bebott bo Sundshålet, Västerfjärden, Uds 5.7 (Christer Olsson), 2 nyligen flygga ungar Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 15.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 6 nyligen flygga ungar Gästerviken, Brattåsfjärden 16.7 (Mattias Laisfeldt).
Många: 320 ad rast Stor-Vitskärsdiket, Yttre Västerfjärden 9.5 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 300 ex Bränsjön 12.5 (Micael Jonsson), 420 ex rast Vitskärtjärn, Obbola 13.5 (Anders Hällström).

Sent fynd: 1 2K+ Grundskatan, Bjuröklubb 3.11 (Katarina Stenman).
Sammantaget rapporterades ca 110 häckande par. Samtliga häckningsplatser utom en (Kamviken, Burträsk) var belägna vid eller i närheten av kusten. Novemberfyndet är anmärkningsvärt men inte rekordsent. Det finns t.ex. två decemberfynd i Vb sedan tidigare.

Gråtrut Larus argentatus
Många: 100 ex Degermyrans soptipp, Skellefteå 24.3 (Erik Normark), 80 par med minst lika många ungar, Ytter-Åhällan, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), max 200 ex Dåvamyrans soptipp, Umeå 22.9-21.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Agnes Eriksson).

Kaspisk trut Larus cachinnans*
(0/0 - 1/1) 1 2K rast Dåvamyrans soptipp, Umeå 21.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Agnes Eriksson). Ny art för Västerbotten! Den kaspiska truten häckar från Svarta havet till de centralasiatiska stäpperna. Den rör sig över stora områden och finns regelbundet från Östeuropa till Nordafrika och Centralasien. I södra Sverige är den en vanlig gäst och ses årligen med ca 1 000 ex i kärnområdet Öland, Gotland, Blekinge och Skåne. I Norrland är dock fynden få. Fem godkända fynd finns registrerade i Artportalen sedan 1900. Ett i Hälsingland 1955, tre i Gästrikland (2012,



Kaspisk Trut *Foto: Niklas Andersson*

2017 och 2018) och ett i Ångermanland 2018. Misstänkta kaspiska trutar har setts tidigare i Västerbotten, såväl vid Sönnerstgrundet 1.5 2001 som vid Stora Fjäderägg 20.5 2005, men dessa blev aldrig säkert bestämda.

Silltrut Larus fuscus
Häckningar eller möjliga häckningar: 11 ad Nörd-Hällgrundsbrottet, Sillhällorna, Bjuröklubb 28.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 6 ex varnande Inner-Åhällan, Norrmjöle 17.6 (Peter Sunesson), 2 nyligen flygga ungar Skepparkallen, Ostnäshalvön 4.8 (Emmanuel Naudot), 20 nyligen flygga ungar Ytter-Åhällan, Norrmjöle 22.8 (Hans Bång).
Sena fynd: 1 1K str St Fjäderägg 5.10 (Andreas Garpebring), 2 1K Dåvamyrans soptipp, Umeå 5.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann), 1 1K förbifl Tavastudden 14.10 (Emmanuel Naudot).

Tundratrut/silltrut, underarten graellsii Larus heuglini/fuscus graellsii*
(11/11 - 1/1) 1 4K+ rast Dåvamyrans soptipp, Umeå 5.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann). Första fyndet i landskapet sedan 2009. Årets fågel visade karaktärer som pekade på ett västligt ursprung, troligtvis underarten graellsii. Detta baserat på ruggningsstatus i handpennorna som passade fint in på just intermedius/graellsii samt inte minst att fågeln anlagt vinterdräktsstreckning på huvudpartiet, vilket fuscus (den underart som normalt förekommer i Västerbotten) och heuglini (tundratrut) normalt anlägger i vinterkvarteren runt Mellanöstern.

Skräntärna Hydroprogne caspia
Häckningar: 24 par rapporterades göra häckningsförsök varav 19-20 totalt lyckades få ut åtminstone 31 ungar (ett par hade fortfarande ägg den 10.7 och utgången är inte känd). I de fyra fall där häckningen misslyckades bedöms minkpredation vara orsaken. Trots detta måste häckningsframgången för landskapets skräntärnor ha varit mycket god 2018. Samtliga par utom ett häckade i landskapets södra del. I Sverige som helhet häckar drygt 500 par varav drygt

hälften i en och samma koloni i norra Uppland. I början av 1970-talet fanns ca 900 par i landet. Därefter skedde en påtaglig minskning. De sista 20 åren har dock den svenska stammen varit något så när stabil.

Silvertärna Sterna paradisaea
Sent fynd: 1 ex Lövöbådan, Hsk 13.10 (Jan Melander, Martin Lagmo).

Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus*
(4/4 - 1/1) 1 ex Brånsjön 20.5 (Christer Laggar, Jonas Gustafsson m.fl.). Landskapets femte vitvingade tärna stannade bara en dag men som tur var så upptäcktes den tidigt på morgonen en söndag så många av traktens skådare kunde ändå ta sig till lokalen och se den tjusiga fågeln. Tre av de nu totalt fem fynden är gjorda under 2010-talet.

Svarttärna Chlidonias niger*
(42/44 - 1/1) 1 ad Dammen N Jvg, Uds 16.5 (*Niklas Andersson, *Agnes Eriksson m.fl.). Svarttärnan är inte årlig i Västerbotten men har under den senaste 20-årsperioden observerats i genomsnitt vartannat år, senast 2017 men dessförinnan med en lucka från 2013. Flertalet fynd är från kusten eller kustnära lokaler. Inte sedan 1993 har arten observerats längre in i landskapet. Det året sågs ett ex vid vardera Brånsjön och Vajsjön, Norsjö.

Storlabb Stercorarius skua* (35/36 - 3/4)
2 ex str S Tavastudden 20.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Tavastudden 27.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex str SV Svart-Lass, Hsk 14.9 (Thomas Sundström). Att döma av dräktkaraktärer gör rrk Vb bedömningen att det rör sig om fyra olika individer som observerades i landskapet under året. Senast arten observerades i Västerbotten var 2013.

Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus
Nordsträckare under våren: 1 ad Lillhällan 2.5 (Andreas Garpebring), 1 ad Sönnerstgrundet 5.5 (Micael Jonsson), 1 ex Tavastudden 6.5 (Albin Enetjärn, Isak Vahlström, Linus Jonsson), 1 ad Holmöfärjan 11.5 (Niklas Andersson, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 2 ex Bjuröklubbs fyr 11.5 (Joakim Wallström, Patrick Degerman). Totalt ynka 6 ex på nordsträck, vilket ytterligare accentuerar den nedåtgående trenden. Summan är den lägsta sedan sträckräkningarna i V Kvarken blev en någorlunda regelbunden företeelse i slutet av 1980-talet. Sträckbevakningen har visserligen gått ner på sistone men det kan näppeligen vara enda förklaringen.
Sydsträckare under hösten: 1 ex Skötgrönnan, Burvik 28.9 (Elis Ölfvingsson, Axel Jensen, Johan Jensen), 1 1K Tavastudden 11.11 (Emmanuel Naudot), 1K Blågrundsudden, Sörmjöle 11.11 (Johan Forssell).

Kustlabb Stercorarius parasiticus
Häckningar: Två lyckade och minst fem möjliga häckningar längs kusten från Bjuröklubb i norr till Hörnefors i söder.
Vårsträck: Korrigerat för dubbelräkningar bokfördes totalt 43 nordsträckande kustlabbar, 1 obstämd kust-/bredstjärtad labb och 2 obestämda labbar, en summa som knappt motsvarar hälften av en "normal" sträckvår. Bästa dag blev den 2.5 med 10 ex str NO under eftermiddagen från Lillhällan, Holmön (Andreas Garpebring).
Höststräck: Under hösten bokfördes, korrigerat för dubbelräkningar, ca 50 sydsträckande kustlabbar och ytterli-

gare ca 10 obestämda labbar. En klart godkänd höstsumma. Höga dagssummor blev 14 ex str SV Tavastudden 11.8 (Emmanuel Naudot, Henrik Johansson), 18 ex str SV Lövöbådan, Hsk 25.8 (Thomas Sundström).

Fjällabb Stercorarius longicaudus
1 1K str SV Lövöbådan, Hsk 25.8 (Thomas Sundström), 1 1K str SV Skrakögern, Hsk 25.8 (Thomas Sundström), 1 1K str SV Ostögrundet 30.8 (Emmanuel Naudot), 1 1K str NV Lillklyvan, Hsk 15.9 (Thomas Sundström), 1 1K förbifl Ostögrundet 22.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg). Fem höstfynd utgör en normal fyndbild för arten i landskapet. Att däremot inget vårfynd gjordes är ovanligare.

Ob. kust-/fjällabb Stercorarius parasiticus/longicaudus
Samtliga fynd: 5 ex str SV Lövöbådan, Hsk 25.8 (Thomas Sundström), 1 1K str SV Ostögrundet 15.9 (Emmanuel Naudot), 1 1K förbifl Ostögrundet 22.9 (Emmanuel Naudot, Ralf Norberg), 1 ex str NO Lillklyvan, Hsk 22.9 (Thomas Sundström). De uppräknade fynden gäller misstänkta fjällabbar men där observationsförhållandena varit sådana att art inte gått att fastställa säkert. Rapporterna från Lillklyvan och Ostögrundet den 22.9 bedöms vara samma individ varvid årssumman landar på 7 ex.

Sillgrissla Uria aalge
Samtliga fynd: 1 ex str NO Sönnerstgrundet 5.5 (Micael Jonsson), 1 ex str NO Lillhällan, Holmön 13.5 (Andreas Garpebring), 1 ex förbifl farleden, Holmöarna 16.5 (Per Hansson), 1 ex rast Grundskatan, Bjuröklubb 20.5 (Håkan Olsson), 1 ex rast Tavastudden 27.5 (Emmanuel Naudot), 1 ex förbifl Västra Kvarken 14.7 (Niklas Andersson), 1 ex rast St Fjäderägg 2.10 (Andreas Garpebring, Anders Hällström).

Under senare år har observationer av sillgrissla i landskapet blivit färre. Under 2017 noterades 10 fynd om totalt 14 individer och under 2018 bara 7 fynd av lika många fåglar. Åren 2009-2015 gjordes oftast dubbelt så många observationer, medan åren dessförinnan låg antalet fynd på samma nivå som de senaste tre åren. Kanhända är det bara tillfälligheter? Lägre frekvens av sträckskådande vid södra kusten under maj-juli är en möjlig förklaring. Sillgrisslebeståndet på den för Vb närmaste häckningsplatsen (ön Bonden i norra Ångermanland) har ökat från 800 par 1997 till 1 300 par 2017 så ett minskat antal häckande par i närområdet kan inte förklara att antalet rapporterade sillgrisslor har minskat i landskapet.

Tobisgrissla Cepphus grylle
Häckningar: Noterad under häckningstid på lämpliga öar med enstaka par upp till dryga 500 individer på ett 20-tal platser längs kusten, flest rapporter kommer från de skådartätare södra delarna av landskapet. Större kolonier (>50 ex): max 581 ex Lillgrundet, St Fjäderägg 12-16.5 (Niklas Andersson, Niklas Lindberg Alseryd, Isak Vahlström m.fl.), 80 ex Sillhällorna, Bjuröklubb 2.6 (Mattias Laisfeldt, Joakim Wallström, Patrick Degerman), 160 ex Ytter-Åhällan, Norrmjöle 26.6 (Christer Olsson, Jan-Erik Malmstigen, Hans Bång), 73 ex Måkläppen, Hörnefors skärgård 13.7 (Johan Forssell), 58 ex Långörudden, Bjuröklubb 17.7 (Staffan Andersson).

Vinterfynd (jan): 1 2K Kont, Yttre

Västerfjärden 4.1 (Thomas Sundström), 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 26.1 (Nils Karlsson).
Vinterfynd (dec): 1 ex Blågrundsudden, Sörmjöle 6-30.12 (Ralf Norberg, Micael Jonsson), 1 1K Lövöudden 11-28.12 (Ralf Norberg, Thomas Sundström, Emmanuel Naudot m.fl.), 3 ex Karlsborg, Holmsund 16.12 (Emmanuel Naudot, Joakim Linder).

Hög sträcksumma: 75 ex str NO Lillhällan, Holmön 3.5 (Andreas Garpebring).
Tobisgrisslan är en art som gått starkt tillbaka i landet i stort och även längs Västerbottenskusten, troligen till stor del pga predationstryck från mink på ungar men kanske även av trut- och kråkfåglar. Flera större kolonier hyser fortfarande många par men frågan är hur många ungar de lyckas producera? Vid en inventering av kustfåglar på Holmöarna utförd av Umedeltats fågelstation på uppdrag av Länsstyrelsen 2018 noterades totalt på alla öar som besöktes endast EN unge av tobisgrissla.

Skogsduva Columba oenas
Under året gjordes 21 observationer under häckningstid, i lämpliga häckningsbiotoper. Arten häckar sparsamt i landskapet, gärna i närheten av jordbruksbygd.
Sent höstfynd: 1 ex Röbäcksdalen (gården), Uds 17.11 (Pontus Wennesjö, Niklas Andersson, Agnes Eriksson).

Ringduva Columba palumbus
Många på hösten: 1 507 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 1 850 ex str SV Storberget, Sörmjöle 25.9 (Ralf Norberg), 2 221 ex str SV Sönnerstgrundet 1.10 (Birger Risberg).

Turturduva Streptopelia turtur
Årets enda fynd blev 1 ex rast Lövöudden 19.5 (*Birger Risberg, Joakim Linder). Arten har länge, om än med knapp nöd, varit årlig i landskapet. Under 2017 gjordes dock inget säkerställt fynd och åren närmast dessförinnan 2, 3, 1 respektive 4 fynd. I landet som helhet föreligger en långsiktigt vikande trend, med en halvering av antalet fynd sedan början av 1990-talet. År 2017 gjordes endast 49 fynd totalt i Sverige vilket enligt "Fågelåret 2017" hör till de lägsta årssummorna "i modern tid". Arten har minskat snabbt globalt sett och är av Bird Life International klassad som hotad.

Större turturduva Streptopelia orientalis*
(4/4 - 1/1) 1 1K Degernäs by, Uds 20.11-12.12 (*Jan Eriksson m.fl.). Vilken lycka att som fågelskådare få upptäcka en större turturduva på sin egen fågelmatning. Den lyckan fick Jan Eriksson uppleva i slutet av november. Många, såväl lokala, som från södra delen av landet tillresta, skådare fick sedan möjlighet att betitta fågeln. Fr.o.m. luciadagen var den dock spårlöst borta. Till och med 2018 har nu 32 fynd gjorts av arten i landet. Västerbotten toppar tillsammans med Norrbotten landskapsligan med 5 fynd vardera.

Turkduva Streptopelia decaocto
Häckningar: Turkduvan häckar med uppskattningsvis 15-20 par i spridda stadsdelar av Umeå och med några enstaka par i Skellefteå och Ursviken-Skelleftehamn. Under året konstaterades två häckningar i form av var sitt bobyggande par i Röbäck, Umeå (Andreas Garpebring) och Öhn, Ursviken,

Skellefteå (Patrick Degerman).

Fynd utanför kärnområdena i Umeå och Skellefteå/Skelleftehamn: 1 ex Kåge 27.1-2.6 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström, Örjan Tjernström m.fl.), 1 ex Byske samhälle 25.4 (Lars Lindmark), 1 sp Rönnholmen, Hörnefors 11.5 (Håkan Persson, Anders Carlberg), 1 sp Långsjön, Överklinten 16-17.5 (Mats Walheim), 1 sp Holmö kyrkväg 55, Holmöarna 23.5 (Per Hansson), 1 sp Tåvägen 5, Vindeln 30.5-1.6 (Henrik Sporrong), 2 i par V Spöland, Vännäsby 2.6-5.9 (Peter Nordin m.fl.), 1 ex Vännänget, åkermarken Ö om, Vännäsby 20.6 (Jonas Gustafsson), 1 ex Ersmark 29.6 (Anne Israelsson Bengtsson), 1 ex Tavelsjö skola 7.7 (Mikael Sandström), 1 ex Flarken, Ånäset 27.9 (Johannes Esberg).

Många: 20 ex Söderslätt, Teg, Umeå 27.1 (Sören Wulff, Gunnar Odell).
Förvånansvärt många och väl spridda fynd av arten utanför kärnområdena. Även sett till rapporteringen från kärnområdet i Umeå kan en ökning av antalet rapporter liksom antalet platser som turkduvan rapporteras från skönjas under senare år. En ren slump eller är den nedåtgående trenden för turkduvan möjligen på väg att brytas?

Fjälluggla Bubo scandiacus*
(62/65 - 1/1) 1 ex Kallviken, Lövånger 24.7-10.8 (Mattias Laisfeldt, Pontus Wennesjö, Frida Johnsson m.fl.). Tio år sedan senaste fyndet av fjälluggla i landskapet och därtill, precis som senaste gången vintern 2008, en långstannare. Enligt sommarstugeägare i trakten hade ugglan setts redan vid midsommartid och kanske rentav tidigare än så. Hur som helst så kom den till skådares kännedom på kvällen den 24.7 då Patrick Degerman fick meddelande från en tidigare arbetskamrat om att en stor vit uggla höll till vid en tjärn vid Lövånger. Patrick hade inte möjlighet att kolla men kontaktade Mattias Laisfeldt som tog sig dit och efter en liten stund hittade ugglan. De närmast följande veckorna kom flera hundra skådare från hela landet till platsen och kunde i sommarvärmen beskåda fågeln. Det har diskuterats flitigt om ålder och kön på ugglan. Till följd av dräkt- och ruggningsförlopp hålls det för troligt att det rörde sig om en äldre hona.

Berguv Bubo bubo
Fem revir av berguv rapporterades under 2018 vilket är ett färre än under föregående år. Alla var längs kusten. Artens långsiktigt negativa trend i Västerbotten tycks således fortsätta även om födotillgången 2018 nog också kan ha haft en tillfällig påverkan.

Kattuggla Strix aluco*
(23/26 - 1/1) 1 ex hörd/sedd Sikeå, Robertsfors 11-18.4 (Lars Lundqvist), 1 ex spel Ön, Reningsverket, Umeå 17.4 (Ralf Norberg m.fl.), 1 ex spel Degernäs, Uds 23-28.4 (Jörgen Kragh, Sören Wulff m.fl.), 1 ex spel Dammen N Jvg, Uds 27.7 (Umedeltats Fältstation), 1 ex spel Plattformen, Häradsvägen, Umeå 19.12 (Mats Strandberg).
Sjätte året i rad med kattuggla i landskapet. Rrk gör försiktigtvis bedömningen att fynden i och i närheten av Umeå under våren-sommaren-vintern 2018 rör samma individ som flugit runt i jakten på en hona och att det dessutom är samma individ som noterades på Böleäng 2017. Därför stannar antalet nya fynd vid ett, även om det inte kan uteslutas att det rör sig om flera individer i Umeå



Lappugga *Foto:Niklas Andersson*

och dess närhet. Inte i något fall har dock kattuggla hört under samma kväll vid olika lokaler i/runt staden. Möjligen kan bilden klarna framgent eftersom det fortsätter höras kattuggla i området.

Slaguggla Strix uralensis
Häckningar kommunvis: Norsjö 1, Skellefteå 14, Robertsfors 1, Umeå 4 och Vindeln 12. Sammanlagt hela 32 häckningar, vilket är ett gott resultat för landskapet. Både Vindeln och Skellefteå k:n hade god tillgång på mat, i form av sork. I landskapets södra delar (Umeå och Robertsfors k:n) verkade det lovande under början av maj månad, i samband med koll av slaguggleholkar. Det verkade dock tyvärr som om sorkstammen i denna del av landskapet kraschade under den känsligaste tiden, dvs. i mitten av maj, vilket medförde att några häckningar misslyckades.

Lappuggla Strix nebulosa
Häckningar: Tjugotre konstaterade häckningar, där minst 38 ungar producerades, och spelande fåglar på ytterligare minst 11 lokaler gör 2018 till ett av de bästa lappuggleåren i Västerbotten under 2000-talet. Fynden av häckningar och revirhävdande fåglar var väl spridda över landskapet från norr till söder och från väster till öster. Fynd gjordes under årets alla månader utom december. Under hösten sågs flera fåglar under dagtid sittande längs större trafikerade vägar indikerande att gnagartillgången då var svagare vilket tvingade fram ugglorna att söka föda på "övertid".

Hökuggla Surnia ulula
Häckningar: En lyckad häckning konstaterades i landskapet resulterande i 4 pull (Mattias Laisfeldt, Niklas Andersson m.fl.). Parning observerades vid ytterligare en lokal (Anders Hällström). Båda platserna är kustnära i den norra delen av landskapet. Detta var sjunde året under 2000-talet som arten konstaterades häcka i Västerbotten. Sannolikt häckade arten på betydligt fler platser eftersom spelande hökugglor noterades, eller i vart fall gjordes det observationer av hökugglor under häckningstid på yt-

terligare 21 lokaler med lämplig häckningsbiotop.

Sparvuggla Glaucidium passerinum
Ingen häckning kunde konstateras, men revirhävdande fåglar noterades på ca 10 lokaler under våren. Däremot observerades ovanligt många individer under hela hösten fördelat på totalt 60-70 olika lokaler. Med hänsyn taget till var det bor större mängder fågelskådare får observationerna anses vara väl spridda över landskapet. Sammantaget bör årssumman landa på ca 100 olika observationer vilket indikerar ett bra år för arten.

Pärluggla Aegolius funereus
Häckningar. Tio konstaterade häckningar och ca 170 ropande hanar under året indikerar att 2018 var ett ganska bra år för arten, även om det inte var något riktigt toppår. Flertalet observationer var koncentrerade till den södra delen av landskapet, men med hyfsad mängd ropande fåglar upp till ungefär i höjd med en linje mellan Bjuröklubb och Granö. Norr därom var fynden mycket fåtaliga. Fyndbilden är så pass tydlig att det är troligt att 2018 var ett betydligt sämre gnagarår i norra delen av landskapet även om den givetvis även speglar att det är högre skådaraktivitet i landskapets södra delar jämfört med de norra.

Hornuggla Asio otus
Häckningar kommunvis: Skellefteå 30, Robertsfors 2, Umeå 8 samt Vännäs 2. Totalt minst 42 säkra häckningar, vilket är det näst bästa dokumenterade resultatet för arten i landskapet sedan 1990, bara slaget av utfallet år 2014 då 46 säkra häckningar kunde konstateras. Summerar man kullstorlekarna under 2018 så hamnar man på minst 102 kläckta ungar. Man kan dock konstatera att arten endast häckar i landskapet i samband med god födotillgång. År 2016 och 2017 konstaterades exempelvis ingen häckning alls.

Vinterfynd: 1 ex Vännäs Norra 28.11 (Daniel Nordgren), 1 ex Degernäs, NV slätten, Uds 15.12 (Mats Strandberg).

Jorduggla Asio flammeus
Häckningar: Tre konstaterade häckningar samt starka häckningsindicier på ytterligare nio lokaler, samtliga inom 5 mil från kusten från Skellefteå i norr till Umeå i söder.
Många: minst 5 ex Degernäs, SV slätten, Uds 17.4 (Daniel Nordgren).

Nattskärra Caprimulgus europaeus*
(50/53 - 1/1) 1 ex förbifl Storstorlidtjärn, SV Byske 12.6 (Håkan Tyrén). Arten är nästan årlig i landskapet även om det saknas fynd från t.ex. 2017. Arten hade under det tidiga 1900-talet en större utbredning i Sverige. Främst gäller detta Norrlands inland liksom längs Norrlandskusten, där arten då var en regelbunden häckfågel i Medelpad, Ångermanland och Västerbotten. Under perioden 1970-1990 uppvisade nattskärran minskande populationer i flertalet europeiska länder, men situationen förbättrades under perioden 1990-2000 även om det i de norra delarna av utbredningsområdet fortfarande sker en minskning. En riksinventering som genomfördes 2007 visade att det svenska beståndets storlek bör ligga runt 7 000 par.

Tornseglare Apus apus
Rekordtidigt fynd: 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 25.4 (Erik Normark). Det

tidigare fenologirekordet var från 5.5 1973.

Blåkråka Coracias garrulus*
(4/5 - 1/1) 1 ex rast Mariehemsängarna, Umeå 6.8 (Lennart Norberg gm Christer Olsson), 1 2K+ rast Kassjö 9-12.8 (*Jonas Gustafsson, Tommy Magnusson m.fl.). Så äntligen, 48 år efter senaste fyndet i landskapet, upptäcktes återigen en blåkråka i Vb. Rrk gör bedömningen att det rör sig om en och samma individ som först sågs kort och fotograferades av Lennart Norberg vid Mariehemsängarna inne i Umeå den 6.8 och sedan återupptäcktes av Jonas Gustafsson den 9.8 vid Kassjö.

Extra roligt var det att fågeln stannade i Kassjö flera dagar vilket gav såväl lokala som tillresta skådare möjlighet att titta på den. I Sverige förekom blåkråkan i mitten av 1800-talet tämligen allmänt, lokalt allmänt, i de sydöstra delarna av landet och Mälardalen. Utbredningsgränsen utgjordes då approximativt av en linje Halmstad-Jönköping-Karlstad-Gävle. Arten minskade därefter snabbt och den var redan omkring år 1900 sällsynt. Den sista häckningen på Fårö (och i Sverige) ägde rum 1967. Arten minskar i antal inom sitt nuvarande häckningsområde vilket också påverkar fyndbilden i Sverige. Inte sedan 2012 har något fynd gjorts i Sverige. Under 2018 gjordes dock ytterligare ett fynd än det i Vb, ett på Gotland av två fåglar.

Härfågel Upupa epops
(130/131 - 1/1) 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 8.9 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström). Årets observation gör att Västerbotten nu haft en obruten fyndsvit på 39 år! För flera år, inklusive 2018, har det dock bara rört sig om ett enda fynd. Tidpunkten för årets fynd är typiskt för landskapet. Tre fjärdedelar av alla fynd är gjorda på hösten och de flesta av dessa just i september-oktober.

Göktyta Jynx torquilla
Häckningar: 2 i par föda åt ungar Gumbodahamn, byn, Ånäset 7.5-26.6 (Leif Bildström), 1 ex föda åt ungar Bjännkälen, Hössjö 16.6 (Peter Sunesson), 2 1K pulli/nyligen flygga ungar Norra Tuvan, Skellefteå 4.7 (Pontus Wennesjö), 1 ad föda åt ungar Hössjö NV 5.7 (Peter Sunesson). Fyra konstaterade häckningar och därtill 29 spelande individer. Lämplig häckningsbiotop tycks kunna variera till en viss del, men arten tycks föredra kulturbygd med inslag av åker- och hagmarker, större trädgårdar, parker samt löv- och blandskog med inslag av öppnare partier.

Tretåig hackspett Picoides tridactylus
Häckningar: par/bo med ungar Spoluddsbrännan, Tjäderbergets naturreservat, Ekorrsele 22.5-4.7 (Andreas Garpebring), par/bo med ungar Tungspenebrännan, Sjulsmyrans naturreservat, Sibirienområdet 1.6-14.8 (Andreas Garpebring). Dessutom gjordes observationer av revirhävdande par eller enstaka fåglar på ytterligare 19 lokaler med lämplig häckningsmiljö för arten. Årets båda konstaterade häckningar skedde i skog som naturvårdsbränts under de senaste åren. Dessutom ligger fem av de övriga 19 fyndlokalerna i eller intill naturvårdsbrända skogar. Utav de 21 rapporterade reviren ligger dessutom hela 15 i naturreservat.

Även om det inte kan uteslutas att upptäckt och rapportering av arten i högre grad sker i skyddad natur än i skogslandskapet i stort, torde ovanstående

fyndbild vara hyfsat representativ för artens val av häckningsmiljö i Västerbotten. I första hand väljs brandskadad skog med många döda träd, därefter större sammanhängande områden med äldre naturskogar och i sista hand mosaikartade områden med inslag av äldre skog och döda träd. I områden med enbart välskött produktionsskog torde arten saknas helt.

Det vore mycket intressant att veta hur stor andel av Västerbottens häckande par av arten som återfinns i naturreservat eller motsvarande områden med skyddad skog? En inte allt för vågad gissning är att det är en betydande andel, detta trots att skyddad skog bara utgör några procent av skogslandskapet i regionen. Följdfrågan blir då: hur vanlig var då den tretåiga hackspetten i Västerbotten innan införandet av det moderna skogsbruket?

Höststräck: Sammanlagt noterades bara 15 sydsträckande (både sträckande och individer som gjorde sträckförsök) tretåiga hackspettar under hösten. Samtliga av dessa fynd gjordes på Sönnerstgrundet. Högsta dagssumman blev 3 ex den 28.9 (Ralf Norberg, Sören Wulff, Pontus Wennesjö m.fl.)

Mindre hackspett Dendrocopos minor
Häckningar: 1 säker häckning och därtill minst 37 revir har rapporterats in under året, vilket är i ungefärlig nivå med fjolårets siffra. Arten trivs i områden med hög förekomst av lövträd, gärna med inslag av äldre sådana.

Vinterfynd: 1 hona Djupsundsudden, Holmsund 2-18.1 (Ulf Viklund, Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 hona f Diktesgrundet, Täftelandet 5.1 (Gunnar Odell), 1 hane Tidesviken, Nedre Sävarån 3.2 (Mikael Wikström), 1 ex Åsen, SO Åsträsk, Villvattnet, Burträsk 6.11 (Rolf Sandberg), 1 hona Stor-Sandskär, Uds 23.11-31.12 (Per Bernhardsson), 1 ex Bussjö motorbana 2.12 (Mats Strandberg), 1 ex Tidesviken, Nedre Sävarån 8.12 (Mikael Wikström).

Vitryggig hackspett Dendrocopos leucotos
Häckning: 1 par lyckades få ut en flygg unge på en oväntad lokal i mellersta Västerbotten. Utöver detta sågs 1 par i lämplig häckningsbiotop, men någon häckning kunde där inte konstateras. Under vårvintern sågs totalt 15-20 individer varav flera revirhävdande hanar.

Spillkråka Dryocopus martius
Häckningar: 1 ex bobygge Yttertavle, Umeå 21.4 (Albin Enetjärn, Oskar Lövbom, Linus Jonsson), 1 ex bobesök Lövånger 22.5 (Mattias Laisfeldt), 2 i par bobesök Sundshålet, Västerfjärden, Uds 6.6 (Christer Olsson), 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Obbola industritipp, Uds 27.6 (Christer Olsson). Endast fyra konstaterade häckningar. I övrigt finns ca 140 rapporter, med lägre häckningsindicier, fördelade på ca 50 olika lokaler. Antalet lokaler/revir är dock svårbedömt då spillkråkor har stora revir och dessutom kan höras över mycket stora avstånd.

För att försvåra bedömningen ytterligare rapporterar flertalet skådare fåglar från den punkt de själva står på snarare än att försöka pricka in var i landskapet den ropande eller trummande spillkråkan sitter. Just i fallet med vittljudande arter som spillkråka kan den platsen ofta vara flera km från observatörens position. Fynden av spillkråka

har en mycket stark koncentration till Umeå och dess omnejd, en fyndbild som snarare speglar fågelskådarnas utbredning än spillkråkans.

Gråspett Picus canus
Inga säkerställda häckningar rapporterades under 2018. Fynd av revirhävdande fåglar under häckningstid (mitten av mars-juni) gjordes på 26 lokaler från Storkågeträsk i norr till Norrmjöle i söder, vilket är normalt för 2010-talet. Höststräck: De flesta sträckande gråspettarna rapporterades som vanligt från Sönnerstgrundet där totalt 31 ex noterades under perioden 18.9-16.10. Det är fler än under 2017 och 2016 då 20 sträckande noterades men färre än 2015 då summan hamnade på 48 ex. Som mest under en och samma dag noterades 5 ex str SV 29.9 (Ralf Norberg, Emmanuel Naudot m.fl.) samt 7 ex som sträckte eller gjorde sträckförsök 7.10 (Marcus Östman, Jan Roslin m.fl.).

Tornfalk Falco tinnunculus
Höststräck: 54 sträckande individer i protokollen är en hyfsad höstsumma. Bästa dagssiffrorna blev 21 ex den 16.9 Sönnerstgrundet (Johan Forssell, Mikael Wikström m.fl.), samt 20 ex den 23.9 Harrevelsudden, Täftelandet (Ulf Skyllberg).

Aftonfalk Falco vespertinus* (62/64 - 1/1)
1 2K hane str Lillskärsudden 17.5 (Christer Olsson). Arten är nästan årlig i landskapet och sedd 14 av åren sedan millennieskiftet, dock inte 2016 och 2017.

Stenfalk Falco columbarius
Höststräck: 22 sydsträckande individer noterades, med 9 ex Sönnerstgrundet 16.9 (Birger Risberg, Ralf Norberg m.fl.) som bästa dag.

Lärkfalk Falco subbuteo
Inga säkerställda häckningar men observationer av par eller ensamma fåglar under häckningstid i lämpliga miljöer på minst 23 lokaler. Huvuddelen av observationerna är från kustregionen.

Pilgrimsfalk Falco peregrinus
Häckningar: 1 par i vardera Skellefteå och Norsjö k:n lyckades få ut tre resp. 2 ungar. Således två säkra häckningar i landskapet, precis som under 2017.

Törnskata Lanius collurio
Fem säkra häckningar och därtill ett 20-tal observationer av fåglar i lämpliga häckningsmiljöer.

Varfågel Lanius excubitor
En säker häckning konstaterades i Hössjö 5.7 (Peter Sunesson). Därtill sågs varfåglar på 13 olika lokaler under häckningstid i lämplig biotop.

Sommargylling Oriolus oriolus *
(27/27 - 1/1) 1 ex sj Degernäs by, Uds 2.6 (Thomas Ågren, Christina Adolfsson). Ett typiskt fynd av arten i landskapet, dvs. en sjungande och kortstannande individ i juni månad. Av nu 28 fynd i landskapet så är 16 gjorda i juni.

Lavskrika Perisoreus infaustus
Noterad på ca 45 lokaler i landskapet under året, de allra flesta väster om en tänkt nord-sydlig linje ca 4-5 mil från kusten. Klart högre fyndkoncentration i den södra halvan av landskapets inland jämfört med den norra. Ett fyndmönster som troligen har att göra med att det södra inlandet besöks mer frekvent av skådare, men det kan inte uteslutas att det spelar in att en högre frekvens av äldre skogar och skogliga värdekärnor

har identifierats i södra delen av landskapet jämfört med i den norra.

Kustnära fynd: 2 i par Bäcksjön, Bjännsjöå, Västra Sjulsmark 16.3 (Jörgen Andersson), 2 ex Norr om Stor-Rödmossamyran, Burträsk sn 20.11 (Stig Holmqvist), 1 ex Stöversjön, Medle, Skellefteå 21.11 (Allan Larsson).

Nötskrika Garrulus glandarius
Höststräck: Totalt noterades 518 sydsträckare (sammanräknat från Artportalen och sträckdatabasen Picea, även inkluderande fåglar som noterats för sträckförsök) mellan 8.9-16.10. Höga dagssummor var 50 ex 21.9 (Birger Risberg), 89 ex 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 76 ex 1.10 (Birger Risberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson), alla vid Sönnerstgrundet.

Nötkråka Nucifraga caryocatactes
Inga konstaterade häckningar har registrerats, men det föreligger ett 10-tal noteringar av revirhävdande fåglar, främst i skogar runt Umeå, men även kring Vännäs och Hörnefors. Nötkråkan är notoriskt skygg och diskret på häckplats varför det sällan görs häckningsfynd. De många fynden av provianterade nötkråkor i främst Umeå och Skellefteå från juli månad och framåt indikerar dock att arten inte är en allt för ovanlig fågel i skogarna runt våra städer och större samhällen.

Råka Corvus frugilegus
Under perioden 4.4-10.5 sågs enstaka råkor och små grupper om upp till tre ex på en rad platser kring Umeå stad och i Umeälvens delta och slätter. Enstaka fynd gjordes även omkring Kåge och Lövånger, vid Bråns jön samt längs kusten i södra delen av landskapet.

Det totala antalet fåglar är mycket svårbedömt då de rör sig mellan olika lokaler samt att det troligen sker ett omfattande utbyte av fåglar då en del drar vidare mot N medan andra just anländer. Flertalet av de äldre råkor som observeras kring Umeå under vårens antas tillhöra den population som häckar kring Uleåborg i Finland.
Tidigt fynd: 1 ad Vasskurvan, Oljehamnen, Holmsund 18.3 (Thomas Sundström).

Sommarfynd: 1 2K Dammen N Jvg, Uds 25.6 (Emmanuel Naudot), 1 ex Kvarnsvedjan, Sörfors 1.7 (Andreas Garpebring).

Sidensvans Bombycilla garrulus
Häckning: 5 ex pulli/nyligen flygga ungar Sjulsmyrans naturreservat, Sibirienområdet 2.7 (Andreas Garpebring). Dessutom 17 över landskapet väl spridda fynd av par eller ensamma fåglar i lämplig häckningsmiljö under häckningstid.

Höststräck: Under hösten noterades sammanlagt 8 297 sydsträckande sidensvansar 8.9-18.11 från olika uddar i kustbandet. Höga dagsnoteringar från Sönnerstgrundet var 1 131 ex 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 2 432 ex 29.9 (Birger Risberg, Ralf Norberg), 780 ex 1.10 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 1 128 ex 6.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Joakim Öhman).
Stora ansamlingar: 700 ex Umeå uthamn, Holmsund 3.10 (Christer Olsson).

Svartmes Periparus ater
Höststräck: totalt noterades 358 sydsträckande svartmesar, de flesta från

Sönnerstgrundet. Högsta dagssummor var 61 ex 23.9 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 173 ex 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl). Noteringen om 173 sträckande individer är den näst högsta dagssiffran för landskapet i sträckdatabasen Picea, rekordet där är från den 20.9 1998 då 195 svartmesar sträckte ut från Sönnerstgrundet. Dessa dagsnoteringar förbleknar dock då man jämför med rekordåret 1990 då ca 9 000 ex sträckte ut vid lokalen under en veckas tid med en högsta dagsnotering om 5 337 ex den 27.8.

Tofsmes Lophophanes cristatus
Häckningar: 1 par. bobygge Kulbäcksliden, Vindeln 15.4 (Lars-Göran Nilsson), 1 ad föda åt ungar Lill-Bursjön, Hössjö 6.6 (Peter Sunesson), 1 par + 3 1K föda åt ungar Vartasberget, Hössjö 9.7 (Peter Sunesson). I övrigt är arten noterad från ca 100 lokaler med ett till fem ex per lokal. Fynden är väl spridda över landskapet även om flest fynd återfinns i skådartäta regioner. Frågan är om inte artens ökning, som pågått en längre tid i södra delen av landet, nu även börjat visa sig norröver? Från att ha varit en rätt exklusiv häckfågel i framförallt äldre tallskog på sandsediment längs älvdalarna har den under senare år börjat dyka upp allt längre från dessa miljöer. I dag påträffas arten i snart sagt alla typer av äldre barrskog i landskapet, även om tallskogar föredras. Frågan är om det finns ett enda gammelskogsreservat i landskapet som saknar tofsmes som häckfågel?

Övriga anmärkningsvärda fynd: 1 ex Innerviken, Holmön 24.7 (Andreas Drott), 1 ex ringm T-vägen, Uds 1.9 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Joakim Linder). Fyndet på Holmöarna är det sjätte för ögruppen totalt och blott det andra under 2000-talet. Att en utpräglad hemortskär skogsfågel som tofsmes fastnar i ett ringmärkningsnät mitt ute på en jordbruksslätt får även det anses anmärkningsvärt. Bägge fynden visar dock på att flyttrörelser även förekommer hos tofsmes. Troligtvis handlar det om ungfåglar på jakt efter lämpliga områden att etablera revir i.

Talltita Poecile montanus
Höststräck: totalt noterades 279 sydsträckande talltitor på uddar i kustbandet, en låg summa som visar på att talltitan inte hade någon invasionsrörelse att tala om 2018. Rekordåret 2004 sträckte 3 163 ex vid Sönnerstgrundet den 2.10.
Många: 75 ex sträckförsök Sönnerstgrundet 15.8 (Birger Risberg, Ralf Norberg), 50 ex rast Näsudden, Skellefteå hamn 19.9 (Aron Andersson), 86 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl).

Lappmes Poecile cinctus
Vid Sönnerstgrundet noterades sammanlagt 13 ex sträckande mot SV, eller i vart fall görande sträckförsök, enligt följande: 1 ex 21.9 (Birger Risberg), 2 ex 23.9 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 1 ex 25.9 (Andreas Garpebring), 1 ex 26.9 (Per Johan Ulfendahl), 1 ex 28.9 (Ralf Norberg, Pontus Wennesjö, Jörgen Fritzson), 2 ex 29.9 (Ralf Norberg m.fl.), 2 ex 30.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Joakim Öhman), 2 ex 1.10 (Tommy Magnusson), 1 ex hörd 4.10 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson). Utöver fynden vid Sönnerstgrundet gjordes följande observationer av arten under året: 3 ex Lillklyvan, Hsk 23.9 (Thomas Sundström), 1 ex Bussjöheden 28.9 (Christer Olsson), 1 ex

Vattuögrarna, Djäkneboda 30.9 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Jörgen Andersson), 1 ex Holmö by 7.10 (Micael Jonsson), 1 ex Sand, Uds 14.11 (Mats Strandberg, Nils Karlsson), 1 ex Djäkneböle 12.12 (Martin Lagmo). Femton fynd av 21 individer utgör ett bra lappmesår för landskapet. Särskilt med tanke på att det under 2017 inte gjordes något fynd alls, vilket å andra sidan är rätt unikt. Den svenska populationen bedöms ha minskat påtagligt under 2000-talet och arten är numer klassad som sårbar.

Blåmes Cyanistes caeruleus
Viss flyttningsrörelse kunde noteras under hösten. Totalt noterades 465 sydsträckande ex på olika uddar längs kustbandet. Högsta dagssumman var 304 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl). Noteringen är den näst högsta dagssumman för sträckande blåmes i landskapet, endast slagen av 414 ex Lillhällan, Holmöarna 20.10 2012.

Talgoxe Parus major
Höststräck: arten uppvisade en hyfsad invasionstendens under hösten. Sammanlagt räknades 1 681 sydsträckande ex på uddar i kustbandet. Högsta dagssummorna gjordes vid Sönnerstgrundet med 311 ex 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 341 ex 1.10 (Birger Risberg, Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 575 ex 6.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Joakim Öhman). Summorna utgör tre av fyra högstanoteringar i landskapet enligt sträckdatabasen Picea. Rekordet är dock 729 sydsträckare vid Trappudden, Holmöarna från 9.10 2010.

Trädlärka Lullula arborea
Vår: 1 rast Sävar 7.4 (Mikael Wikström), 1 str N Svartön, Dalkarlsåns mynning, Bygdeå 14.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 rast fälten vid E4, Gärdefjärden 28.4 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 sj Kåddisheden, Umeå 8.5 (Tommy Magnusson), 3 sj Grustag N Salomonsbesök, Hissjö 10.5-16.6 (Lars Edenius, Tommy Magnusson, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 str NO Bjuröklubbs fyr 11.5 (Mattias Laisfeldt, Katarina Stenman, Joakim Wallström m.fl.), 1 rast Grundskatan, Bjuröklubb 20-22.5 (Håkan Olsson, Erik Normark).

Höst: 1 förbifl Holmö by 19.9 (Micael Jonsson), 1 rast Röbäcksslätten, Uds 23.9 (Christer Olsson). Elva individer fördelat på nio lokaler är en tämligen normal årssumma för arten i Västerbotten.

Sånglärka Alauda arvensis
Många: 200 ex rast Plattan, E4 kontrollplats, Uds 18.4 (Ralf Norberg).

Berglärka Eremophila alpestris
1 ex rast Djäkneböle 24.4 (Peter Sunesson). Arten är nätt och jämnt årlig i landskapet.

Backsvala Riparia riparia
Häckningar eller möjliga häckningar: 40 ex bobesök Öst-Tegs industriområde, Umeå 16.5-29.6 (Tommy Magnusson, Anders Hellgren, Lars Hellgren m.fl.), 50 ex bobesök Brännlandsberget, Umeå 25.5-15.8 (Bertil Brånin), 10 ex bobesök Svartberget, Djäkneböle 1.6 (Peter Sunesson), 15 ex bobesök Anumark, Umeå 17.6 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson), 80 i par bobesök Klockarbäckens industriområde, Umeå 30.6 (Birger Risberg), 30 ex bobesök Granö-Tegsnäset 5.7 (Lage Sandgren), 10 ex

bobesök Nyåkersberget, Tjälamark, Umeå 9.7 (Mats Strandberg), 5 ad föda åt ungar Stöningsberget, Innertavle 15.7 (Ralf Norberg). Sammanlagt ca 240 ex fördelat på åtta kolonier.

Ladusvala Hirundo rustica
Tidigt fynd: 1 ex Gärde, Gärdefjärden 20.4 (Anders Lindström, Lena Andersson). Många: 300 ex rast Hissjön, Hissjö 3.8 (Tommy Magnusson), 500 ex Obbolstenarna, Yttre Västerfjärden 15.8 (Tommy Magnusson), 662 ex str SV Ostögrundet 25.8 (Andreas Garpebring, Mikael Wikström). Totalt under hösten noterades ca 1 500 sydsträckande ladusvalor från främst olika uddar i kustbandet. Dagssumman om 662 sydsträckare vid Ostögrundet är den näst högsta som noterats för landskapet i sträckdatabasen Picea.

Hussvala Delichon urbicum
Många: 120 ex Ratuträsket, Djäkneboda 12.8 (Niklas Andersson). Hussvalan är en av de arter som minskat allra kraftigast under senare år enligt svensk häckfågeltaxering. Ansamlingar på över 100 ex är sannerligen inte vardagsmat i landskapet under senare år.

Rostgumpsvala Cecropis daurica*
(6/6 - 1/1) 1 ex Storavan, Stöcke 17.5 (*Birger Risberg, Dag Österlund m.fl.). Fågeln sågs födosöka tillsammans med andra svalor under kvällen. Tyvärr rörde sig svalorna ganska snart bort från lokalen och endast de skådare som befann sig närmast, när larmet gick, hann se fågeln. Liksom samtliga tidigare fynd i landskapet gjordes även detta inom tidsspannet 10.5-8.6.

Stjärtmes Aegithalos caudatus
Häckningar: 5 ex pulli/nyligen flygga ungar RC-Flygfältet, Brånsjön 21.6 (Mats Axbrink), 7 pulli/nyligen flygga ungar Gästerviken, Brattåsfjärden 22.6 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Stor-Nabbviken (myr), Uds 25.6 (Christer Olsson), 2 i par pulli/nyligen flygga ungar Sand, Uds 4.7 (Christer Olsson). Totalt minst fyra säkra häckningar och därtill sågs enstaka par i lämplig häckningsbiotop. Arten trivs i fuktig löv- och blandskog med rik undervegetation och med inslag av döda och döende träd. Under hösten tycks inget kraftigt inflöde från öst ha skett, men som vanligt sågs en hel del grupper om uppåt 30-45 ex, främst längs kustbandet, men även på flera håll i inlandet.

Lövsångare Phylloscopus trochilus
Tidigt fynd: 1 ex Långviksskatan, Täftelandet 24.4 (Gunnar Odell).
Många: 200 ex rast St Fjäderägg 20.5 (Andreas Garpebring), 130 ex rast Vattuögrarna, Djäkneboda 12.8 (Niklas Andersson), 300 ex rast Obbola industritipp 12.8 (Andreas Garpebring, Per-Olof Nilsson, Vidar Lindroos), 200 ex rast Lillhällan, Holmön 2.9 (Micael Jonsson).
Sena fynd: 1 ex ringm St Fjäderägg 1.10 (Andreas Garpebring, Anders Hällström), 1 ex spel/sång Moröhöjden, Skellefteå 1.10 (Mattias Laisfeldt), 1 ex rast Hössjöbäcken, Hössjö 3.10 (Peter Sunesson).

Gransångare Phylloscopus collybita
Sent fynd: 1 ex Lövöbådan, Hsk 9.11 (Jan Melander).

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix
103 sjungande hanar har rapporterats under året, vilket är en relativt normal

siffra sett till den senaste 10-årsperioden. Arten trivs i ljus lövskog, blandskog eller parkanläggningar och dylikt. Arten anländer under första halvan av maj och flyttar tidigt, ofta redan under slutet av juli. Sent höstfynd: 1 rast Lillhällan, Holmön 2.9 (Micael Jonsson).

Tajgasångare Phylloscopus inornatus
Fastlandsfynd: 1 ex Klintsjölänningen 152, Ånäset 7.9 (Per-Olof Nilsson), 1 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 8.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 3 ex Bjuröklubbs fyr 9.9 (Aron Andersson), 1 ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 9.9 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Näsudden, Skelleftehamn 9.9 (Aron Andersson), 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 10.9 (Aron Andersson), 1 ex ringm Rönnfällan, Norsjö 13.9 (Anders Lindström), 1 ex ringm Obbola industritipp, Uds 13.9 (Darius Stracevicius), 1ex ringm Danielsten, Bureå 17.9 (Linus Andersson), 2 ex Näsudden, Skelleftehamn 19.9 (Aron Andersson), 1 ex Rönnfällan, Norsjö 20.9 (Lars Bruks, Anders Waldenström, Anders Lindström), 1 ex Hamrinsberget, Umeå 21.9 (Micael Jonsson), 1 ex Moröhöjdens elljusspår, Skellefteå 22.9 (Mattias Laisfeldt), 2 ex Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 1 ex Ängsbacka NR, Uds 2.10 (Christer Olsson), 1 ex Pilgatan, Umeå 5.10 (Torsten Elfhag).

Höstens första fynd gjordes den 7.9 på Holmön och därefter sågs arten nästintill dagligen under hela september och några dagar in i oktober. Höstens sista fynd gjordes den 6.10, på Stora Fjäderägg. Totalt rapporterades 51 individer under året vilket är något lägre än för var och ett av de två föregående åren, då över 80 individer noterades. Flest fynd gjordes som vanligt ute på Holmöarna inkl. Stora Fjäderägg där det ringmärktes totalt 11 ex under perioden 9.9-5.10 (Sören Wulff, Eskil Nygren, Fredrik Grensman m.fl.).

Lundsångare Phylloscopus trochiloides
Samtliga: 1 sj Holmögadd 19.5 (Lars Edenius, Christer Larsson), 1 sj Holmö kyrkväg 55, Holmöarna 20.5 (Per Hansson), 1 sj stugbyn, Sandviktjärn, Holmön 30.5 (Per Hansson), 1 sj Nydalasjön, Kinabron, Umeå 17.6 (Robert Stenmark), 1 sj EFS Backen, Umeå 21-27.6 (*Jörgen Olsson, Karl-Gunnar Rehn, Tommy Magnusson m.fl.), 1 sj Bureå 24.6 (Ulf Wiklund), 1 sj Gamla tippen, Obbola 1.7 (Jan Melander), 1 sj Lövöbådan, Hsk 19.7 (Joakim Lessmann), 1 ex St Fjäderägg 15.8 (Christer Olsson, Bertil Strömberg). Under året rapporterades endast nio individer, vilket är tämligen magert. Under de senaste tio åren har det i genomsnitt noterats 16 fåglar per år. Majoriteten av årets fynd gjordes i landskapets södra kustband, framför allt på Holmöarna, vilket stämmer väl överens med den normala fyndbilden. Märkligt nog gjordes inget fynd ute på Bjuröklubb.

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
Observationer under häckningstid: 101 sjungande individer har rapporterats, väl spridd över landskapet, även om en klar majoritet av fynden ligger relativt kustnära.

Många (>10): 19 sj Nedre Sävarån 6.6 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Emil Larsson), 12 sj Gärdefjärdens naturreservat, Lövånger 13.6 (Allan Larsson), 16 ringm Obbola industritipp, Uds 25.8 (Tommy Magnusson, Darius Strasevicius).

Busksångare Acrocephalus dumetorum
Samtliga: 1 sj Fabriksviken, Hörnefors 30.5-10.6 (Christer Olsson, Henrik Blommé, Thomas Ågren m.fl.), 1 sj Långhalsviken, Obbola 31.5-19.6 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 sj Degernäs by, Uds 2-3.6 (Isak Vahlström, Roland Jansson, Jan Eriksson m.fl.), 1 sj Stigen Grundskatan-Sillhällorna, Bjuröklubb 2.6 (Birger Risberg), 1 sj Stöcksjö, Umeå 3-4.6 (Thomas Ågren, Christina Adolfsson, Andreas Garpebring m.fl.), 1 sj Grubbströms gård, Holmön 3-16.6 (Per Hansson, Urban Lundström, Ruben Bergh Drott m.fl.), 1 sj Fiskbäckens mynning i Vindelälven, Vännäsby 4.6 (Christer Olsson), 1 sj Ödekyrkogården, Holmön 5-16.6 (Ruben Bergh Drott, Andreas Drott, Lotta Berg m.fl.), 1 sj Gärde, Gärdefjärden 6-9.6 (Anders Lindström, Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström), 1 sj Tväråmark, Sävar 7-8.6 (Andreas Garpebring, Jörgen Andersson, Niklas Andersson m.fl.), 1 sj Tavlefjärden, Yttertavle 7.6 (Andreas Garpebring), 1 sj St Fjäderägg 10.6 (Rode Nordin, Kerstin Stam, Birgitta Chorell m.fl.), 1 sj Ekmans kulle, Uds 11-12.6 (Dag Österlund, Tommy Magnusson, Bertil Brånin), 1 sj Kvarnbäcken, Hössjö 12-28.6 (Peter Sunesson, Per Lindström, Margita Lindström m.fl.), 1 sj Hällastrand, Uds 18-30.6 (Kerstin Årdahl, Mats Axbrink, Ralf Norberg m.fl.), 1 sj Bygdsiljum 18.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 sj Rickleå, Bygdeå 24.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 1 sj Hössjöbäcken 27.6 (Peter Sunesson), 1 sj Mångbyån vid Brännkyan, Lövånger 2-7.7 (Niklas Lindberg Alseryd). En varm vår/försommar gav möjlighet till många bra kvällar för att lyssna på nattaktiva sångare. Totalt noterades under året 19 revirhävande hanar, vilket är i samma nivå som för de senaste fem åren.

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus
1 ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 15.9 (Mattias Laisfeldt), 1 rast Skötgrönnan, Burvik 30.9 (Elis Ölfvingsson, Axel Jensen, Johan Jensen).
På grund av brist på lämpliga häckningsbiotoper är rörsångaren den mest ovanliga av våra vanligt förekommande nattsångare. Det är väldigt anmärkningsvärt att inte ett enda fynd av en sjungande rörsångare gjordes i landskapet under häckningstid. Det senare av årets två fynd, som båda var i september, var ett nytt fenologirekord för arten i landskapet, dessutom i Skellefteå kommun, vilket får anses som anmärkningsvärt!

Kärrsångare Acrocephalus palustris
1 sj Megrundet, Sörmjöle 18.5 (Musse Björklund, Per Lif), 1 sj Bråsjön 10-21.6 (Mikael Wikström, Johan Forssell, Tora Byström m.fl.), 1 sj Brännölandet, Holmsund 17-22.6 (Joakim Linder, Ralf Norberg, Rolf Sandberg m.fl.), 1 sj Ö Blisterliden, Bygdsiljum 18.6 (Niklas Lindberg Alseryd). Totalt fyra fynd, samtliga av sjungande individer.

Härmsångare Hippolais icterina
Totalt 35 sjungande individer, vilket är en tämligen normal årssiffra. Arten trivs i lummiga lövskogsmiljöer ofta med inslag av rik undervegetation.

Gräshoppsångare Locustella naevia
Nio sjungande individer har rapporterats under året: 1 Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 24.5-21.6 (Jan Eriksson, Kerstin Årdahl, Ralf Norberg m.fl.), 1 Nördstrandshålet, Djäkneboda 2-24.6 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Staffan Andersson m.fl.), 1 västra Stöcksjö, Umeå 3-7.6 (Thomas Ågren,

Christina Adolfsson, Andreas Garpebring m.fl.), 1 Tallfröplantagen, SV flygplatsen, Uds 3-9.6 (Birger Risberg, Isak Vahlström), 1 Lappvik, Lövånger 7.6-6.7 (Staffan Andersson, Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg Alseryd m.fl.), 1 Botsmarksjön Sävaråns inlopp, Botsmark 10-18.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 Lill-Sandskär, Uds 27.6 (Christer Olsson), 1 Obbola industritipp, Uds 28.6-6.7 (Christer Olsson, Anders Hellgren, Lars Hellgren m.fl.), 1 inre Lövselefjärden, Lövånger 16-19.7 (Niklas Lindberg Alseryd).

Flodsångare Locustella fluviatilis
1 sj Fiskbäckens mynning i Vindelälven, Vännäsby 26.5-20.6 (Jörgen Olsson, Jonas Gustafsson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 sj Obbolavägen E12, avfart Lövviken-Västernabben, Uds 22.6-7.7 (Isak Vahlström, Sören Wulff, Joakim Linder m.fl.). Återigen ett år med enbart två sjungande flodsångare. I gengäld stannade båda individerna länge, till glädje för många skådare.

Svarthätta Sylvia atricapilla:
Många under häckningstid: 5 sj Stora Tuvan, Uds 13.6 (Christer Olsson).
Vinterfynd (jan-feb): 1 hane Ålidhöjd, Umeå 1.1-3.2 (Emmanuel Naudot, Niklas Andersson, Ralf Norberg m.fl.), 1 hane Eriksdal, Holmsund 1-21.1 (Joakim Linder, Mikael Wikström, Birger Risberg m.fl.), 1 hona Prästbordet, Skellefteå 27.1 (Joakim Wallström, Patrick Degerman).
Vinterfynd (dec): 1 hona Grubbe, Umeå 8-19.12 (Hans Bång, Bertil Brånin), 1 ex Umedalen, Umeå 31.12 (Harry Pettersson).

Blott tre vinterfynd under årets inledande och två under årets avslutande månader är den lägsta summan övervintrande svarthättor på många år. Kanske har senare års relativt stränga vintrar tagit hårt på den populationsandel av svarthättan som väljer att försöka övervintra istället för att flytta?

Trädgårdssångare Sylvia borin
Sena fynd: 1 ex ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 14.10 (Mattias Laisfeldt), 1 ex ringm St Fjäderägg 17.10 (Albin Enetjärn, Marc Illa Llobet), 1 ex rast Holmögadd 20.10 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Lars Edenius m.fl.).

Höksångare Sylvia nisoria*
(44/44 - 3/3) 1 ex Klintsjölänningen 152, Ånäset 7.9 (Per-Olof Nilsson), 1 1K ringm Danielsten, Bureå 28.9 (Linus Andersson), 1 1K ringm St Fjäderägg 20.10 (Albin Enetjärn, Carl Jansson, Tove Westberg m.fl.).

Under året gjordes alltså tre fynd, varav alla var ungfåglar på höstflyttning. Arten är inte årlig i landskapet och senast arten sågs i landskapet var 2015. Majoriteten av alla fynd har varit ringmärkta fåglar vilket även stämmer för årets fynd.

Ärtsångare Sylvia curruca
Sent fynd: 1 ex ringm St Fjäderägg 15.10 (Albin Enetjärn, Marc Illa Llobet).

Törnsångare Sylvia communis
Häckningar: 1 ad matande 4 1K Ikea-området, Söderslätt, Uds 21.6 (Ann-Katrin Sjögren), 1 ad matande 3 1K Gran, Umeå 3.7 (Roland Jansson).
Sammanlagt noterad på ca 100 lokaler i landskapet, om en till max sex individer per lokal. Flertalet fynd är gjorda längs med kusten eller inom några km från kustbandet.

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes
Häckningar: 1 ex besöker bo, Carlshöjdsskogen, Umeå 9.6 (Ann-Katrin Sjögren), 5 1K pulli/nyligen flygga ungar östra Hössjö 30.6 (Peter Sunesson). Revirhållande fåglar har noterats på ca 100 lokaler runt om i landskapet, med en stark koncentration till den SÖ delen. Gärdsmygens intåg som häckfågel i Västerbotten verkar således fortsätta på bred front.
Vinterfynd: 1 ex Häradsvägen, Backen, Umeå 18.11 (Lars Edenius).

Nötväcka Sitta europaea
Elva säkerställda häckningar i landskapet under året varav nio i Umeå och dess närområde samt två i Skellefteå. Nötväckan är numera en väl etablerad häckfågel och fynd av revirhållande fåglar finns i stort sett över hela landskapet men med högst koncentrationer kring städer och i älvdalar. Enstaka fynd av nötväcka görs numera även i mer eller mindre rena barrskogsbestånd långt från närmaste bebyggelse.

Stare Sturnus vulgaris
Vinterfynd (jan-feb): 8 ex Röbäcksdalen (gården), Uds 1.1-21.2 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.).

Vinterfynd (dec): 4 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 12-30.12 (Nils Karlsson, Christer Olsson, Dag Österlund m.fl.), 1 ex Naturbruksgymnasiet, Umeå 21-25.12 (Ola Sundberg, Christer Olsson, Lars Edenius).

Ringtrast Turdus torquatus
Vårfynd: Under perioden 14.4-5.5 har totalt 18 individer rapporterats från 16 lokaler. Höstfynd: 1 1K rast St Fjäderägg 6.10 (Andreas Garpebring), 1 honf rast Holmö by 7.10 (Micael Jonsson), 1 rast St Fjäderägg 15.10 (Albin Enetjärn, Marc Illa Llobet).

Sammantaget får detta ses som ett något sämre normalår. Vårfynden dominerar alltid medan höstfynd görs knappt årligen. Sett till den senaste 10-årsperioden har i snitt cirka 30 ringtrastar rapporterats per år. Väderförhållandena under vårflyttningen spelar stor roll för förekomsten i landskapet, då sämre väder tvingar arten att tillfälligt stanna upp under sin flyttning mot fjällvärlden.

Koltrast Turdus merula
Övervintrande koltrastar finns noterade om ett till fyra ex från 50-talet lokaler i Umeå, 10-talet i Holmsund-Obbola och 10-talet i Skellefteå. Därutöver noterad på ytterligare ca 10-talet lokaler i landskapet, företrädesvis i kustregionen. Sammanfattningsvis torde fynden gälla drygt 100-talet individer. Betydligt fler fynd föreligger från årets inledande månader jämfört med december månad. En fyndbild som kanske snarare speglar högre skådaraktivitet vid årets inledning än vid dess slut.

Rödvingetrast Turdus iliacus
Vinterfynd: 1 ex Öst-Teg, Umeå 5.1 (Thomas Sundström).
Många: 700 ex rast Innertavle 24.4 (Christer Olsson).
Taltrast Turdus philomelos
Många: 284 ex str N Bjuröklubbs fyr 29.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt).

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Många sträckare: 1 201 ex str SV Sönnerstgrundet 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 716 ex str SV Sönnerstgrundet 29.9 (Birger Risberg).

Summorna utgör den högsta och näst högsta som noterats för landskapet i sträckdatabasen Picea. Sammanlagt noterades 2 287 sydsträckande dubbeltrastar under hösten.

Rödhake Erithacus rubecula
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Haga, Umeå 28.1-27.2 (Karl-Gunnar Rehn, Ralf Norberg, Dag Österlund).
Sena fynd: 1 ex Nagelhamnsviken, Yttre Västerfjärden 3-4.11 (Christer Olsson, Kerstin Årdahl), 1 ex Holmö by 4.11 (Micael Jonsson), 1 ex Stora Tuvan, Uds 4.11 (Ralf Norberg).
Endast ett vinterfynd är ett lågt antal jämfört med de senaste åren som måttstock.

Blåhake Luscinia svecica
Många: 50 ex rast St Fjäderägg 20.5 (Andreas Garpebring).

Vitstjärnig blåhake Luscinia svecica cyanecula*
(0/0 - 2/2) 1 hane rast Fodercentralen, Holmsund 15.4 (*Tommy Magnusson, Ulf Skyllberg, Thomas Sundström m.fl.), 1 2K+ hane sj Hössjöbäcken, Hössjö 23.5-27.6 (*Peter Sunesson, Lars Edenius, Mikael Wikström m.fl.).
Västerbottens första respektive andra fynd av vitstjärnig blåhake! Sedan tidigare finns två godkända fynd av rasen cyanecula i Norrland. Ett från Ammarnäs, Ly lpm och ett från Haparanda Sandskär, Nb, båda 1988. Denna centraleuropeiska ras skiljer sig från vår egen blåhake genom att hanarna har en vit fläck på övre delen av bröstet. Skillnader finns också i flyttningsbiologi (anländer tidigare och flyttar till N Afrika) och biotopval.

Till skillnad från vår egen blåhake som häckar i fjällvärlden så häckar den vitstjärniga blåhaken gärna i vassbestånd, sankmarker eller efter åar bevuxna med sly och har på senare år börjat etablera sig i NV Skåne samt i Halland.

Näktergal Luscinia luscinia
Samtliga sjungande hanar: 2 ex Fiskbäckens mynning i Vindelälven, Vännäsby 15.5-21.6 (Christer Laggar, Christer Olsson, Karl-Gunnar Rehn m.fl.), 1 ex inre Täftefjärden 17-27.5 (Ulf Skyllberg, Sören Wulff, Joakim Öhman m.fl.), 1 ex Djupvik, Holmsund 21-31.5 (Joakim Linder, Antoine Bos), 1 ex Brån 21 22.5 (Peder Andersson, Christer Laggar), 2 ex Holmö by 23.5-6.6 (Per Hansson, Urban Lundström, Ruben Bergh Drott m.fl.), 1 ex Öhn, Ursviken, Skellefteå 25-29.5 (Patrick Degerman), 1 ex Herrgårdsgatan, Holmsund 25.5 (Joakim Lessmann), 1 ex Skeppsvik 27.5 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 ex Ursviken, Skellefteå 30.5 (Patrick Degerman), 1 ex Ytterholmen, Skellefteälven C 1-11.6 (Pontus Wennesjö, Ulf Wiklund, Mattias Laisfeldt m.fl.), 1ex Avan-kanalen, Tavelsjö 1-5.6 (Tommy Magnusson, Wilhelm Dietrichson), 2 ex Stigen Grundskatan-Sillhällorna, Bjuröklubb 2.6 (Birger Risberg, Joakim Wallström, Patrick Degerman m.fl.), 1 ex Gammbäckens mynning, Falmarksträsket 2.6 (Jonas F Grahn), 1 ex Edenborgviken-Buskarevet, Nedre Sävarån 6.6 (Andreas Garpebring, Julia Pettersson, Emil Larsson), 1 ex Gumbodahamn, byn, Ånäset 18.6 (Leif Bildström).
Ett relativt normalt år för arten i landskapet med 18 sjungande individer.

Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus*
(25/25 - 2/2) Två fynd gjordes under året varav det ena under våren. Båda gällde fåglar som ringmärktes på Stora

Fjäderägg: 1 2K 14.5 (Isak Vahlström, Aron Dynesius), 1 1K 18.9 (Fredrik Grensman, Helena Hallgren, Ingela Källén m.fl.).

Tidigare har endast en individ ringmärkts under våren, den 31.5 1986. Även det fyndet var från Stora Fjäderägg och var då landskapets första fynd av arten.

Mindre flugsnappare Ficedula parva
Häckning: 1 häckning (3 pulli) Stora Tuvan, Uds 2-16.7 (Christer Olsson). Två adulta fåglar sågs mata tre ungfåglar vid två tillfällen. Tidigare under våren hördes två sjungande hanar på lokalen som utgör en optimal häckningsbiotop för arten.

Fynd under häckningstid: 1 sj Bjurön, Bjuröklubb 12-13.5 (Staffan Andersson, Mattias Laisfeldt), 1 sj Tallfröplantagen, SV flygplatsen, Uds 16.5-3.6 (Tommy Magnusson, Lars Edenius, Thomas Ågren m.fl.), 1 sj Storsand, Bjuröklubb 16.5-2.6 (Erik Normark, Håkan Olsson, Mattias Laisfeldt m.fl.), 2 sj Grundskatan, Bjuröklubb 16.5-2.6 (Anders Lindström, Lena Andersson, Joakim Wallström m.fl.), 1 sj Lövskogarna V flygplatsen, Uds 16.5 (Tommy Magnusson), 2 i par i lämplig häckbiotop Storsand, Bjuröklubb 22.5 (Erik Normark), 1 sj Lövånger 22.5 (Mattias Laisfeldt), 1 sj Skellefteå lasarett 24.5 (Per Hansson), 1 3K+ hane sj Tidesviken, Nedre Sävarån 29.5-2.6 (Christer Olsson, Mikael Wikström), 1 sj Bjuröklubb 29.5 (Martin Widén), 1 sj Sävaråns mynning, Nedre Sävarån 2.6 (Pontus Wennesjö, Frida Johnsson), 1 hona Grundskatan, Bjuröklubb 21.6 (Lennart Öhmark), 1 sj Lövånger samhälle 13.7 (Lena Andersson, Anders Lindström).

Under året noterades revirhävdande fåglar på 13 lokaler i landskapet, vilket är i nivå med föregående år. På Bjuröklubb är antalet individer svårbedömt men det rör sig om minst fem sjungande ex. Totalt bedöms 30 individer ha noterats i landskapet under året, vilket är en bra totalsumma. Utöver fynd under häckningstid gjordes nio fynd av tio ex som bedöms vara fåglar under flyttning. Dessa fynd gjordes framförallt på kustlokaler som Holmöarna inkl. Stora fjäderägg under vår- och höst.

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros
(103/105 - 5/5) 1 2K hane Lövöbådan, Hsk 1.7 (Joakim Lessmann), 1 ad hane Lillhällan, Holmön 18.7 (Micael Jonsson), 1 hane Vitberget, Skellefteå 8.8 (Åke Nilsson), 1 hane Häggnäs, Vindeln 12.8 (Lars Bruks), 1 ex Byviken, Holmön 21.10 (Albin Enetjärn, Marc Illa Llobet, Tove Westberg m.fl.).

Årets fem individer utgör en relativt normal siffra för landskapet. Majoriteten av alla tidigare fynd i landskapet är gjorda under vårmånaderna från april till början av juni. Årets fynd sticker därför ut något då alla gjordes under sensommaren/hösten.

Stenskvätta Oenanthe oenanthe
Sent fynd: 1 ex rast Fälten S Stöcke 14.10 (Ralf Norberg).

Strömstare Cinclus cinclus
Möjliga häckningar: 1 ex permanent revir Tavelån, Östra Ersboda, Umeå 1-31.5 (Roger Olofsson).
Vinterfynd: Under vintern noterades övervintrande strömstarar om ett till fyra ex på ca 75 lokaler i landskapet, med en stark koncentration till området i Umeås närhet. Totalt bedöms fynden

röra ca 120 individer.

Gråsparv Passer domesticus
Många: 30 ex Norra Hedensbyn, Skellefteå 2-27.I (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 40 ex Röbäcksdalen (gården), Uds 6.I (Thomas Sundström m.fl.), 40 ex Fodercentralen, Holmsund 28.10-30.12 (Ralf Norberg, Dag Österlund, Gunnar Ekenberg m.fl.), 40 ex Norra Hedensbyn, Skellefteå 25.12 (Mattias Laisfeldt, Katarina Lundström).
Anmärkningsvärda fynd: 1 hane Holmö by 18.7 (Micael Jonsson). Blott femte fyndet för ögruppen under 2000-talet. Gråsparven är sedan den försvann som häckfågel från Holmö by under 1990-talet en förstklassig raritet på Holmöarna.

Järnsparv Prunella modularis
Många: 41 ex str N Bjuröklubbs fyr 5.5 (Mattias Laisfeldt), 40 ex rast Dåvamyrans soptipp, Umeå 22.9 (Niklas Andersson, Joakim Lessmann, Agnes Eriksson).

Forsärla Motacilla cinerea
Häckning: 2 1K Energicentrum, Klabböle, Umeå 4.8-2.9 (Rolf Sandberg, Thomas Johansson, Magnus Enbarr).
Fynd under häckningstid: 1 2K+ hane Mobackendammen, Skellefteå 6-10.5 (Stig Holmqvist, Staffan Andersson, Mats Axbrink m.fl.), 1 honf Bjurfors nedre kraftstn, Tvärålund 24.5 (Roland Jansson).
Vårfynd: 1 hane fd Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 11.4 (Maud Tyboni, Jan Roslin), 1 hona Megrundet, Hörnefors 5.5 (Ralf Norberg, Mats Andersson).
I övrigt gjords rekordmånga fynd under höstflyttningen, totalt 17 individer fördelat på 15 fynd. Majoriteten av fynden gjordes på lokaler i södra kustbandet.

Sädesärla Motacilla alba
Många: 310 ex str SV Sönnerstgrundet 30.8 (Ralf Norberg), 278 ex str SV Ostögrundet 30.8 (Emmanuel Naudot), 210 ex Lövöbådan, Hsk 8.9 (Thomas Sundström), 249 ex str SV Tavastudden 8.9 (Emmanuel Naudot), 280 ex str SV Lillklyvan, Hsk 15.9 (Thomas Sundström), 230 ex str SV Lövöbådan, Hsk 16.9 (Thomas Sundström).

Sena fynd: 1 ex rast Gästerviken, Brattåsfjärden 2.11 (Mattias Laisfeldt), 1 ex Lövöbådan, Hsk 3-13.11 (Jan Melander), 1 ex rast Fodercentralen, Holmsund 3-4.11 (Ralf Norberg, Peter Olsson), 1 ex förbifl Byviken, Holmön 4.11 (Micael Jonsson).

Ängspiplärka Anthus pratensis
Sent fynd: 1 ex Grundskatan, Bjuröklubb 3.11 (Katarina Stenman).

Trädpiplärka Anthus trivialis
Många: 150 ex str SV Vattuögrarna, Djäkneboda 12.8 (Niklas Andersson).
Sent fynd: 1 ex Svart-Lass, Hsk 20.10 (Jan Melander).

Rödstrupig piplärka Anthus cervinus
Vårfynd: 1 str N Lillhällan, Holmön 13.5 (Andreas Garpebring), 1 ex Bränsjön 15.5 (Christer Olsson), 1 ex Dammen N Jvg, Uds 16.5 (Per Johan Ulfendahl), 1 str NO Bergön, Uds 18.5 (Tommy Magnusson), 1 ex Ostögrundet 23.5 (Mikael Wikström), 1 str NV Grundskatan, Bjuröklubb 28.5 (Martin Widén).

Ovanligt många vårfynd gjordes detta år. I övrigt rapporterades 53 fynd om totalt 63 individer under höstflyttningen, mellan 18.8-18.9.

Skärpiplärka Anthus petrosus
Häckning: 1 par + 2 pulli/nyligen flygga ungar Käringskär, Norum 9.7 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson). Många: 6 ex rast Umeå uthamn, Holmsund 8-19.4 (Tommy Magnusson, Michael Gruber, Rolf Segerstedt m.fl.)

Bofink Fringilla coelebs
Vintern 2017/2018 förvandlades bofinken från en sällsynt övervintrare till en allestädes närvarande vinterfågel i Västerbotten! Enstaka bofinkar och smågrupper om två till fem ex blev vardagsmat vid snart sagt varje fågelmatning, åtminstone i landskapets kustbygder. På sina ställen påträffades till och med flockar med mer än 10 ex långt från närmsta fågelbord!

Det exceptionella uppträdandet av övervintrande bofinkar kan förklaras av att den regniga hösten gjorde att jordbrukarna var tvungna att lämna mer än hälften av alla sädesfält oskördade. Detta i kombination med en mild höst gjorde att mängder av finkar valde att stanna kvar då det ju fanns mat i överflöd. När sedan snön täckte fälten sökte sig allt fler finkar in till våra fågelmatningar. Att stora ansamlingar fortfarande kunde påträffas långt in i februari tyder också på att övervintringen kom att lyckas för många av dem. Däremot noterades under december 2018 högst normala mängder med övervintrande bofinkar, vilket visar på att uppträdandet vintern 2017/2018 var ett exceptionellt undantag snarare än ett trendbrott.

Vinterfynd (jan-feb) om minst 10 individer med toppnoteringar per lokal: 20 ex Degernäs, SV slätten, Uds 1.1 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 69 ex Röbäcks by, Uds 2.1 (Andreas Garpebring), 11 ex Bubäcken SO Stöcksjön, Stöcke 2.1 (Bertil Brånin), 12 ex Grisbacka, Umeå 4.1 (Bertil Brånin), 12 ex Kopparvägen, Carlslid, Umeå 5.1 (Sören Wulff), 35 ex Grubbe, Umeå 7.1 (Niklas Andersson, Agnes Eriksson, Per-Olof Nilsson), 20 ex Häradsvägen, Backen, Umeå 7.1 (Tommy Magnusson), 14 ex Karlsborg, Holmsund 14.1 (Thomas Sundström), 10 ex Västerhiske, Umeå 17.1 (Andreas Drott), 15 ex Vitskärsudden 20.1 (Emmanuel Naudot), 30 ex Degernäs, Uds 21.1 (Niklas Andersson, Isak Vahlström, Agnes Eriksson), 25 ex Ostvik C, Kåge 21.1 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 14 ex Söderslätt, Teg, Umeå 21.1 (Thomas Sundström), 23 ex Gammåkersvägen 7, Täfteå 31.1 (Gunnar Odell), 24 ex Myckle, västra delen 3.2 (Stig Holmqvist), 20 ex Västerbacken, Holmsund 3.2 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 27 ex Granvägen 5, Nedre Sävarån 3.2 (Mikael Wikström), 20 ex Linåkersvägen 8, Öst-Teg, Umeå 7.2 (Ulf Norberg), 10 ex Berghem, Umeå 7.2 (Ralf Norberg), 20 ex Stor-Vitskärsdiket, Yttre Västerfjärden 15.2 (Kerstin Årdahl), 16 ex Lärkstigen 3, Sävar 18.2 (Andreas Bernhold), 40 ex Aldermorberget, Täfteå 25.2 (Ulf Skyllberg), 10 ex Öbacka 27.2 (Ann-Katrin AX Sjögren).

Vid en summering av enbart ovanstående fynd landar slutsumman på drygt 500 ex. En försiktig bedömning ger därför att det under årets två första månader lär ha övervintrat minst 1 000 bofinkar i landskapet, troligtvis betydligt fler då det säkerligen funnits stora flockar även i den skådarfattiga mellanbygden och enstaka fåglar kunde påträffas vid närapå vartenda fågelbord.

Bergfink Fringilla montifringilla
Liksom för bofinken innebar vintern 2017/2018 ett exceptionellt gott år för övervintrande bergfinkar. Bergfinken är alltid betydligt sparsammare som övervintrare i Västerbotten än bofinken, vilket även gällde under ett år som detta. Sammantaget sågs enstaka bergfinkar och smågrupper på upp till max fem individer på åtminstone ett 40-tal olika lokaler runt om i landskapet, men med en kraftigt koncentrerad fyndbild till Umeå med dess omnejd. Ofta återfanns arten med enstaka fåglar i de större grupperna av bofink. Högsta noterade ansamlingen av arten var 5 ex Skatvägen, Hörnefors 27.1 (Rolf Sandberg).
Sammanräknat bör det totala antalet övervintrande bergfinkar vintern 2017/2018 ha landat på minst 100-150 ex, alltså ca 10 procent av den totala summan bofink/bergfink.
Under december 2018 var antalet övervintrande bergfinkar åter tillbaka på mer normala nivåer: 1 hona Holmö kyrkväg 55, Holmöarna 6.12 (Per Hansson), 1 ex Gammåkersvägen 7, Täfteå 8-20.12 (Gunnar Odell), 1 hane Jacob Grubbs väg, Grubbe, Umeå 8.12 (Hans Bång), 1 hona Byske samhälle 19-22.12 (Lars Lindmark), 1 ex Parkvägen, Holmsund 23.12 (Per Linder), 2 i par Skyttevägen, Holmsund 30.12 (Ritu Andersson).
Många: Minst 4 000 ex rast Mariehemsängarna, Umeå 28.8 (Pontus Wennesjö).

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
Häckningar/möjliga häckningar: Uppskattningsvis har 16-20 par rapporterats med en klar majoritet från strandbrinkarna längs Umeälven och Skellefteälven. En säker häckning kunde konstateras: 3 1K pulli/nyligen flygga ungar Gran, Umeå 26.6 (Roland Jansson).
Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Byske samhälle 6.1 (Lars Lindmark), 1 ex Sjungande dalen, Skellefteå 11.1 (Erik Normark), 1 ex Kåge 27.1 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 1 ex Gammelstaden 28.1 (Joakim Wallström), 4 i par Ursviken, Skellefteå 25.2 (gnm Micael Jonsson).

Sent fynd: 2 ad hane Gammåkersvägen 7, Täfteå 13.11 (Gunnar Odell).
Vinterfynd (dec): 1 ex förbifl Renmarkstorget, Umeå C 10.12 (Niklas Lindberg Alseryd).

Fynd utanför det normala rapporteringsområdet: 1 ex Holmö kyrkväg 55, Holmöarna 20.4 (Per Hansson), 1 ex rast Bjuröklubbs fyr 29.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt), 1 ex Grubbedal, Lövånger 10.5 (Allan Larsson).

Tallbit Pinicola enucleator
Totalt sågs uppskattningsvis 200 individer under 2018, vilket är en riktigt låg årssumma. Under årets första två månader kunde mindre flockar av tallbit noteras på flera platser i landskapet, varav ett flertal fynd i mer centrala delar av Umeå och Skellefteå. Under mars och april sågs enbart enstaka individer, de flesta från inlandslokaler och knappt några alls från kustbandet. Hösten fortlöpte med väldigt få observationer av arten, totalt sågs då bara 26 individer fördelat på 13 fynd.

Domherre Pyrrhula pyrrhula
Många: 247 ex str SV Sönnerstgrundet 6.10 (Birger Risberg, Mikael Wikström, Joakim Öhman), 112 ex str SV Sönnerstgrundet 14.10 (Mikael Wikström, Hen-

rik Ramebäck, Göran Bylund m.fl.). Sammanlagt noterades 784 sydsträckande domherrar mellan 18.9-18.11 från olika uddar och öar i havsbandet. Årets rekorddag på Sönnerstgrundet uppvisade den näst högsta sträcksiffran för Västerbotten rapporterad i sträckdatabasen Picea. Rekordet är på 311 ex från samma lokal 2014.

Rosenfink Carpodacus erythrinus
Häckningar: 4 1K föda åt ungar Mobackendammen, Skellefteå 21.7 (Pontus Wennesjö) samt fyra möjliga häckningar.
Sommar: Totalt hördes cirka 120 sjungande hanar, vilket får anses som en normal förekomst.
Sent höstfynd: 1 ex ringm St Fjäderägg 10.9 (Sören Wulff, Eskil Nygren).

Vinterhämpling Linaria flavirostris
Totalt har 151 individer rapporterats fördelat på 45 fynd. Årets första rapport var av 1 ex Trutskär, Hsk 3.4 (Thomas Sundström). Därefter gjordes majoriteten av fynden under andra halvan av april. Vårens sista fynd var av 6 ex Hössjö 3.5 (Peter Sunesson). Under hösten gjordes relativt få fynd, endast fem om totalt 14 individer.
Många (>10): 25 ex Gocart-banan, Alvik, Uds 26.4 (Tommy Magnusson), 17 ex Degernäsbäcken, S väg, Uds 28.4 (Rolf Sandberg).

Sent fynd: max 3 ex Fodercentralen, Holmsund 9-30.12 (Christer Olsson, Gunnar Ekenberg, Niklas Andersson m.fl.).

Hämpling Linaria cannabina
Häckning: 2 ex besöker bo, Öbacka, Umeå 7.6 (Ann-Katrin Sjögren). Dessutom noterad under häckningstid på ett 50-tal lokaler i landskapet, varav en förkrossande majoritet återfinns i jordbrukslandskapet kring Umeå.
Tidiga fynd: 1 ex Obbola industritipp, Uds 24-28.3 (Ralf Norberg, Tommy Magnusson, Kerstin Årdahl m.fl.), 1 ex Degernäs by, Uds 29.3 (Thomas Sundström).

Många: 20 ex fd Grisfarmen, Ö Degernäs, Uds 16.4 (Bertil Brånin, Hans Bång), 25 ex Grubbänget, Umeå 22.4 (Lars Edenius), 20 ex T-vägen, Uds 13.7 (Emmanuel Naudot), 40 ex Grubbänget, Umeå 11.8 (Hans Norelius, Eva Edmert), 20 ex Skärberget, Uds 18.8 (Johan Forssell), 30 ex Dammen N Jvg, Uds 2-24.9 (Emmanuel Naudot, Tommy Magnusson, Ralf Norberg m.fl.), 25 ex Dammen S Jvg, SÖ Degernässlätten, Uds 6-7.9 (Dag Österlund, Emmanuel Naudot), 40 ex T-vägen, Uds27.9 (Ralf Norberg).
En försiktig uppskattning är att uppemot ett 100-tal hämplingar bör ha uppehållit sig i slättlandskapet runt Umeå under sensommar och tidig höst.
Sena fynd: 1 ex Sofiehem, Umeå 1.11 (Christer Olsson), 2 ex Fodercentralen, Holmsund 3.11 (Ralf Norberg).

Gråsiska Acanthis flammea
Vårsträck: Under våren noterades 1 719 sträckande gråsiskor. Bästa dagssumma blev 624 ex str N Bjuröklubbs fyr 29.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt).

Höststräck: Totalt noterades 10 558 sträckande gråsiskor under hösten. Rapporter om fler än 1 000 sydsträckande individer var 1 250 ex 18.9 (Ralf Norberg), 1 030 ex 23.9 (Mikael Wikström, Ralf Norberg, Emmanuel Naudot m.fl.), 2 177 ex 25.9 (Andreas Garpebring, Per Johan Ulfendahl), 2 172 ex 29.9 (Birger Risberg) alla från Sönnerstgrundet, 1 500 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 30.9 (Niklas An-

dersson, Agnes Eriksson).

Brunsiska Acanthis flammea cabaret
Under året har 58 ex av gråsiska tillhörande underarten cabaret (brunsiska) rapporterats. Fynden är från Obbola industritipp, Uds, Stora Fjäderägg och från Vattuögrarna, Djäkneboda. Samtliga utom tre utgjordes av ringmärkta fåglar.

Snösiska Acanthis flammea exilipes
Totalt har ca 90 individer av gråsiska tillhörande underarten exilipes (snösiska) rapporterats i landskapet under året. Sextiofyra av rapporterna gällde fåglar som fångades i samband med ringmärkning medan ca 26 gällde observationer i fält.

Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus
Under häckningstid noterad på ett 40-tal lämpliga lokaler i landskapet, men inga fynd med några högre häckningskriterier har rapporterats.
Många: 49 ex str N Bjuröklubbs fyr 29.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt), 78 ex förbifl Bjurliden, Norsjö 7.6 (Albin Enetjärn).

Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Många: 705 ex str N Bjuröklubbs fyr 29.4 (Niklas Lindberg Alseryd, Mattias Laisfeldt).

Bändelkorsnäbb Loxia bifasciata
Under året rapporterades 636 individer fördelat på 79 fynd, vilket är något över det normala för landskapet men långt ifrån siffrorna från rekordåren 2013 och 2014. Under våren gjordes enstaka fynd spritt över landskapet. Från mitten av juni ökade antalet fynd och sträckrörelserna i kustbandet blev allt tydligare. Under juli sågs småflockar nästintill dagligen, där en majoritet av fynden gjordes ute på Bjuröklubb. Där räknades totalt 141 ex sträckande mot NV 23.6-18.7 (Niklas Lindberg Alseryd). I slutet av juli minskade antalet fynd och därefter sågs enbart enstaka individer under hela hösten.

Många (>40): 60 sträckförsök Bjuröklubbs kapell 6.7 (Niklas Lindberg Alseryd), 72 str NV Bjuröklubbs fiskeläge 16.7 (Niklas Lindberg Alseryd).

Steglits Carduelis carduelis
Säkra häckningar: 5 ex pulli/nyligen flygga ungar Gran, Umeå 24.6 (Roland Jansson), 3 pulli/nyligen flygga ungar Grubbe, Umeå 27.6 (Niklas Lindberg Alseryd), 1 pulli/nyligen flygga ungar Västerslätts industriområde, Umeå 3.7 (Bertil Brånin), 2 pulli/nyligen flygga ungar Moröhöjden, Skellefteå 23.7 (Mattias Laisfeldt).

Många: 24 ex Skellefteå värmeverk 17.8 (Aron Andersson), 37 ex Tomtebo/Kolbäckskorsningen, Umeå 27.8 (Pontus Wennesjö).
Fyra säkra häckningar innebär ett nytt rekord för landskapet, därtill sågs också flera familjegrupper under sensommaren. Antalet fynd är numera svårt att uppskatta, men det verkar helt klart att arten fortfarande är på frammarsch i landskapet då fynden har ökat år för år. En klar majoritet av individerna verkar flytta och anländer under slutet av mars och sticker sedan söderut under hösten. Att arten övervintrar i landskapet tycks dock inte vara helt ovanligt, uppskattningsvis sågs ett 15-tal individer under januari-februari samt december.

Grönsiska Spinus spinus
Under mitten av september sträckte stora mängder grönsiskor söderut efter kusten. Under perioden 30.8-4.10 räknades 41 918 ex vid Sönnerstgrundet. Som mest sågs 13 520 ex 16.9 (Ulf Skyllberg, Mikael Wikström, Johan Forssell m.fl.) och 18 500 ex 21.9 (Birger Risberg).

Gulsparv Emberiza citrinella
Många:(≥100 ex redovisas): 100 ex Svidjevägen, Uds1.1 (Joakim Linder), 100 ex Fodercentralen, Holmsund 2.1 (Sören Wulff), 150 ex Åheden, Sörmjöle 10.1 (Christer Olsson), 106 ex Kågegården, Kåge 14.1 (Mattias Laisfeldt, Håkan Engström), 100 ex Kasamark, Hössjö 27.1 (Peter Sunesson), 210 ex Ånäset 27.1 (Leif Bildström), 100 ex Storavan, Stöcke 9.12 (Per Johansson), 250 ex Fodercentralen, Holmsund 22.12 (Johan Forssell). Summa summarum så rapporterades fler än 100 ex från sju olika lokaler i landskapet, vilket är fler än under 2017.

Ortolansparv Emberiza hortulana
Under året rapporterades 48 sjungande hanar eller revirhävdande fåglar fördelat på 33 lokaler. Detta är en högre siffra än för 2017 men fortfarande under det normala antalet för de senaste tio åren vilket ligger på cirka 70 sjungande hanar per år. Hössjödalen fortsätter att vara den lokal där flest sjungande individer rapporteras, i år 20 stycken.
Oroväckande är att antalet revirhävdande hanar är så få kring Umeälvens slätter, från Röbäcksdalen i norr till Storavan i söder. Trots att dessa marker är välbevakade och de flesta reviren borde täckas in, kunde enbart två par noteras. För inte alltför många år sedan höll dessa marker 5-15 sjungande hanar per år.

Dvärgsparv Emberiza pusilla*(74/77 - 3/3)
1 ex Skötgrönnan, Burvik 2.9 (Joakim Wallström, Patrick Degerman), 1 ex Norra våtmarken, Skäret, Uds 4.9 (Lars Edenius), 1 1K hane ringm Obbola industritipp, Uds 30.9 (Ralf Norberg, Rolf Sandberg, Fredrik Widman m.fl.). Efter förra årets rekordår blev årets tre fynd en återgång tillbaka till det mer normala.

Videsparv Emberiza rustica
Inga konstaterade häckningar under året. Däremot sågs arten på sju lämpliga häckningslokaler.
Möjliga häckningar: 2 ad i par upprörd, varnande Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 20.6 (Fredrik Grahn), 2 ad i par upprörd, varnande Missenträskbäcken, Jörn 20.6 (Fredrik Grahn).
Fynd under häckningstid: 1 sj Gumbodahamn, Ånäset 21.4 (Leif Bildström), 1 sj Stormyran, Vithattsmyrarna NR, Jörn 9-10.5 (Erik Normark), 1 sj Djupgravbäcken, Lövånger 9.5 (Allan Larsson), 1 sj Isklinten NR 26.5 (Andreas Garpebring), 1 sj Nymyran, Risliden, Vindeln 1.6 (Emil Larsson, Per Nihlén), 2 ex i par Jörns Björkliden 15.6 (Stig Holmqvist).

Många (>10): 34 ringm St Fjäderägg 13.8-13.9 (Christer Olsson, Niklas Andersson, Agnes Eriksson m.fl.), 20 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 18.8 (Jörgen Andersson), 116 ringm Danielsten, Bureå 22.8-17.9 (Linus Andersson), 11 ex Hössjöbäcken 24.8 (Peter Sunesson), 25 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 26.8 (Niklas Andersson), 12 ex Ratuträsket, Djäkneboda 26.8 (Niklas Andersson), 19 ringm Gästerviken, Brattåsfjärden 26.8-16.9 (Mattias Laisfeldt, Niklas Lindberg Alseryd), 20 ex Klintsjölänningen

152, Ånäset 7.9 (Per-Olof Nilsson), 15 ex Vattuögrarna, Djäkneboda 8.9 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson), 15 ex Holmögadd 9.9 (Johan Forssell, Lars Edenius).

Året första respektive sista fynd blev 1 ex Mariehemsgård 17.4 (Lennart Lundberg) och 2 ex Brånsjön 19.9 (Christer Olsson). Trots att arten minskat kraftigt under de senaste åren gjordes relativt många fynd under hösten, varav ett antal med flockar på över 10 individer. Årets häckningssäsong var bra för många tättingar och det är inte osannolikt att även videsparven hade en bra säsong som resulterade i många ungfåglar.

Sävsparv Emberiza schoeniclus
Sent höstfynd: 1 ex rast Obbola industritipp, Uds 4.11 (Niklas Andersson).

Lappsparv Calcarius lapponicus
Många (>20): 35 ex rast T-vägen, Uds 25.4 (Emmanuel Naudot, Johan Forssell), 300 ex rast F.d. Vebomarksträsket, Lövånger 4.5 (Mattias Laisfeldt), 60 ex rast Hökmark, Lövånger 4.5 (Anders Lindström, Lena Andersson), 22 ex rast Ånäset, vid E4 5.5 (Leif Bildström).

Snösparv Plectrophenax nivalis
Vinterfynd: 4 ex rast Degernäs, SV slätten, Uds 1.1 (Niklas Andersson, Jörgen Andersson, Agnes Eriksson), 3 ex Röbäcksslätten, Uds 21.12 (Mats Strandberg).

VOF:s Kommittéer och Projekt

Rapportkommitté landskapet Västerbotten
Niklas Andersson
idunarna@gmail.com
070-3886353

Rapportkommitté Södra Lappland
Håkan Rune
070-2886678

Stora Fjäderägg Fågelstation
Niklas Andersson
idunarna@gmail.com
070-3886353

Umedeltats Fältstation
Per Bernhardtson
pelle.bern@gmail.com

Projekt Kungsörn, Pilgrimsfalk och Jaktfalk
Per-Olof Nilsson
aftonmora60@gmail.com
070-4947230

Projekt Havsörn och Örnutfodring
Jan-Erik Wallin
janerik.wallin@ume.se

Projekt Berguv Nord
Ulf Sperens
ulf.sperens@pelagia.se

Aktuell information

VOF:s hemsida
Senaste nytt och information om föreningens verksamhet på http://vasterbotten.birdlife.se/

Artportalen - Rapportsystemet för fåglar
Rapportera dina senaste observationer och ta del av andras fynd, både lokalt, regionalt och nationellt på https://artportalen.se/

Fåglar i Norra Kvarken
Rapportera och se färska summeringar av sträckande och rastande fåglar på http://fagel.slu.se/

Upphittade ringar
Skickas till Ringmärkningscentralen Naturhistoriska Riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm. Ange när, hur och var ringen hittades. Även via internetformulär på Naturhistoriska riksmuseets hemsida http://www.nrm.se/

Facebookgrupper
"Fåglar i Västerbotten" - Innehåller diskussioner och allmän info om fåglar och fågelskådning i Västerbotten.

"Fågelskådning i Umeå" - Innehåller diskussioner och allmän info om fåglar och fågelskådning med fokus på Umeåområdet.

"Stora Fjäderäggs Fågelstation" - Här hittar man information om stationens pågående verksamhet.

"Umedeltats Fältstation/Ume River Delta Fleld Station" - Senaste nytt om ringmärkning, återfynd och övrig verksamhet från Umeås närmaste fågelstation.

Lokalföreningar / Lokala kontaktpersoner

Umeå Fågelförening (UFF): Tomas Brodin, tomas.brodin@slu.se, 070-2783570
Skellefteå: Mattias Laisfeldt, laisafbjuroklubb@hotmail.com, 070-3861206
Lycksele: Per Hansson, Inlandsbon@hotmail.com 073-0736740
Vindeln: Henrik Sporrong, 0933-61414
Vännäs: Christer Laggar, 070-6517398
Bjurholm: Vakant: Är du intresserad av att bli kontaktperson? Kontakta oss!
Malå: Alf-Rune Öberg, arune@hotmail.se 070-2172483
Nordmaling: Jean-Michel Roberge, 073-0637997
Norsjö: Vakant: Är du intresserad av att bli kontaktperson? Kontakta oss!
Robertsfors: Leif Bildström, calidris55@hotmail.com 070-6503457
Sorsele: Bernt-Erik Nordenström, 0952-10490
Storuman: Håkan Rune, 0951-12294
Vilhelmina: Inga Olofsson, 0940-20157
Åsele: Sture Gustafsson, 0941-66518



Västerbottens Ornitologiska Förening